Potasio gluconato, elixir 20 meq de potasio/ 15 ml frasco 240 ml, Vía oral, código IGSS: 734

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento por vía oral de hipopotasemias causadas por diarreas, vómitos, diuréticos, corticoides, terapia parenteral de sueros salinos y glucosados, arritmias cardíacas debidas a intoxicación por digitalis.

Reacciones adversas: Cuando no se ingiere con alimentos,
pueden algunos casos presentarse irritación de la mucosa gastrointestinal, apareciendo nauseas, vómito, diarrea, malestar intestinal.

Precauciones de uso: Antes y durante el tratamiento, debe realizarse un control de los niveles plasmáticos de potasio, especialmente en pacientes con enfermedad cardíaca, ancianos o con insuficiencia renal, para vigilar la posible aparición de hiperkaliemia.
Debe tomarse con comida o inmediatamente después, para minimizar en lo posible las molestias de estómago o su acción laxante.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al medicamento, nefropatías, oliguria, enfermedad de Addison, deshidratación aguda.
Uso con diuréticos ahorradores de potasio.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.