Alopurinol, tableta o cápsula, 300 mg, vía oral, código IGGS: 945

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Manejo de pacientes con signos y síntomas de gota primaria o secundaria.
Pacientes con leucemia, linfoma y neoplasias malignas que reciben terapia contra el cáncer que causa elevación de los niveles de ácido úrico en suero y orina, cuando este riesgo de sobreproducción ya no esté presente es importante descontinuar el uso de alopurinol.
Pacientes con cálculos recurrentes de oxalato de calcio en donde la excreción diaria de ácido úrico excede los 800 mg /día en pacientes masculinos y 750 mg/ día en pacientes femeninas, en estos pacientes la terapia debe evaluarse cuidadosamente al inicio y reevaluarse periódicamente para determinar riesgo beneficio en cada caso.

Reacciones adversas: Erupción, náuseas, insuficiencia renal, vómitos, ambliopía, artralgias, discrasias sanguíneas, broncoespasmo, anomalías cardiovasculares, cataratas, confusión, disminución de la libido, mareo, equimosis, anomalías electrolíticas, epistaxis, hematuria, hepatotoxicidad, hipotonía, iritis, anomalía de la función renal, retinitis macular, malestar, neuritis, faringitis, prurito, edema de piel, Síndrome de Stevens-Johnson, transpiración, tinnitus.

Precauciones de uso: Suspender al primer signo de reacciones alérgicas (primer signo de erupción, vasculitis o síndrome de Stevens-Johnson, erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos y/o vasculitis generalizada, hepatotoxicidad irreversible).

Contraindicaciones: Pacientes que han desarrollado reacciones severas al principio activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.