Betametasona + Ácido Salicílico, ungüento tubo 15 g, vía tópica, código IGSS: 370

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de manifestaciones inflamatorias de dermatosis hiperqueratosis y secas sensibles a corticoesteroides tópicos como psoriasis y liquen plano.

Reacciones adversas: Atrofia cutánea, estrías, sensación de quemadura, fisuras, eritema, foliculitis, irritación cutánea, prurito, hipopigmentación, hipertensión intracraneal, lesiones acneiformes, infecciones secundarias, cambios de pigmentación, supresión del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal con usos continuos de más de dos semanas.

Precauciones de uso: La terapia tópica de largo plazo con corticoesteroides puede interferir con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, principalmente en niños y jóvenes. Puede llegar a intervenir en el crecimiento y desarrollo de niños.
El uso prologado de corticoesteroides puede aumentar la incidencia de infecciones secundarias, enmascararlas, prolongarlas o exacerbarlas.
El uso de corticoesteroides tópicos puede ocasionar glaucoma, especialmente si se utilizan técnicas de vendaje oclusivo o alrededor de los ojos.
No se debe utilizar en zonas intertriginosas como axilas o inglés. El ácido salicílico puede causar irritación ocular, si existe contacto se deberá lavar por 15 minutos con abundante agua. No debe aplicarse sobre la cara. Las personas con problemas de circulación en vasos sanguíneos deben tener precaución al utilizarlo.
El uso de esteroides tópicos en pacientes con psoriasis puede causar recaídas por efecto rebote, desarrollo de tolerancia, riesgo de psoriasis pustulosa generalizada y

desarrollo de toxicidad local o sistémica. Se ha reportado miopatía aguda con dosis altas de corticoesteroides.

Los corticoesteroides pueden causar problemas psiquiátricos como depresión, euforia, insomnio, cambios de humor y personalidad.

La dermatitis de contacto puede ocurrir y es diagnostica con la falla del tratamiento y el exacerbamiento de la enfermedad.

Se debe usar con precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades del tracto digestivo, insuficiencia hepática, miastenia grave, infarto del miocardio, cataratas o glaucoma, osteoporosis, insuficiencia renal, patología tiroidea y colitis ulcerativa. El tratamiento prolongado puede aumentar el riesgo de padecer Sarcoma de Kaposi.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto, micosis sistémicas, pacientes con rosácea, acné vulgar, infecciones virales cutáneas primarias, prurito perianal y genital, lesiones cutáneas infectadas, dermatosis en niños menores de dos años incluyendo dermatitis de pañal, presencia de tuberculosis o sífilis, sobre heridas abiertas o en los ojos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.