Cefadroxilo, tableta o cápsula, 500 mg, vía oral, código IGSS: 5

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Faringoamigdalitis. Infecciones no complicadas del tracto urinario. Infecciones no complicadas de la piel y tejidos blandos.

Reacciones adversas: Diarrea, dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos, erupción, urticaria, colitis pseudomembranosa, síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia, transaminasas aumentadas, neutropenia.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad:
Se tendrá especial precaución en pacientes con historial de alergias graves o con asma.
En pacientes con historial de hipersensibilidad grave a penicilina, u otros fármacos beta lactámicos no cefalosporínicos, el cefadroxilo deberá ser utilizado con especial precaución por la posibilidad de aparecer alergias cruzadas (incidencia 5-10%).
El tratamiento deberá ser retirado inmediatamente si aparecen reacciones alérgicas (urticaria, exantema prurito, caída de la presión sanguínea o incremente de la frecuencia cardíaca, alteraciones respiratorias, colapso, etc.) y se tomarán las medidas adecuadas (simpaticomiméticos, corticosteroides y/o antihistamínicos).
Pacientes con insuficiencia renal; la dosis deberá ser ajustada conforme al grado de insuficiencia renal.
Pacientes con antecedentes de alteraciones gastrointestinales, particularmente colitis.
Durante su utilización prolongada, se deberá realizar controles frecuentes de recuento sanguíneo y análisis de función hepática y renal.

Puede originar un sobrecrecimiento de Cándida y de otros microorganismos no sensibles (p.e. enterocci y Clostridium difficile), para lo que puede ser necesario la interrupción del tratamiento.
Resultados falsos positivos en el test de Coombs, análisis de glucosa urinaria con el método de reducción de cobre.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o cefalosporinas.
Historial de reacciones graves a las penicilinas o cualquier otro fármaco beta-lactámico. En niños de 6 años de edad o mayores con un peso de menos de 40 kg con insuficiencia renal o que requieran hemodiálisis.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.