Dimenhidrinato, tableta o cápsula, 50 mg, vía oral, código IGSS: 229

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Prevención y tratamiento de los síntomas asociados al mareo por locomoción marítima, terrestre o aérea, tales como náuseas, vómitos y/o vértigos para adultos y niños mayores de 12 años.

Reacciones adversas: Estimulación paradójica del sistema nervioso central (niños y ocasionalmente en adultos); depresión del sistema nervioso central, somnolencia; sedación que va desde somnolencia leve hasta sueño profundo (más frecuente); mareo; lasitud; coordinación perturbada; debilidad muscular; inquietud, insomnio, temblores, euforia, nerviosismo, delirio, palpitaciones, convulsiones es menos frecuente; malestar epigástrico; anorexia; náuseas; vómitos; diarrea; constipación; colestasis, hepatitis, insuficiencia hepática, anormalidad de la función hepática, la ictericia es rara; eccema, prurito, inflamación, erupción papular, eritema en la piel expuesta puede ocurrir con la formulación tópica; taquicardia, palpitaciones Cambios en el electrocardiograma (p. ej., QRS ensanchado); arritmias (p. ej., extrasístole, bloqueo cardíaco); hipotensión; hipertensión: los pacientes geriátricos pueden presentar mareos, sedación e hipotensión; sequedad de boca, nariz y garganta; disuria; retención urinaria; impotencia; vértigo; alteraciones visuales; visión borrosa; diplopía; tinnitus; laberintitis aguda; insomnio; temblores; nerviosismo; irritabilidad; discinesia facial; opresión en el pecho; espesamiento de las secreciones bronquiales; sibilancias; congestión nasal; transpiración; escalofríos; menstruaciones tempranas; psicosis tóxica; dolor de cabeza; debilidad; parestesia; agranulocitosis; anemia hemolítica; leucopenia; trombocitopenia; pancitopenia.

Precauciones de uso: Puede producirse sensibilidad cruzada con otros antihistamínicos.

Precaución en aquellas situaciones que pueden agravarse por sus propiedades anticolinérgicas:

Asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema y bronquitis crónica (se puede producir espesamiento de las secreciones y alterar la expectoración).

Hipertrofia prostática, retención urinaria, enfermedades obstructivas del tracto urinario (se puede agravar la sintomatología).

Enfermedades obstructivas gastrointestinales.

Hipertensión arterial

Glaucoma de ángulo cerrado.

Hipertiroidismo.

Epilepsia.

Pacientes de edad avanzada son más sensibles a los efectos anticolinérgicos centrales y periféricos del dimenhidrinato (sequedad de boca, retención urinaria, glaucoma, náuseas, sedación, confusión e hipotensión).

Puede dificultar el diagnóstico de enfermedades como apendicitis, enmascarar los síntomas inducidos por los medicamentos ototóxicos y enmascarar los signos de toxicidad producidos por sobredosis de otros medicamentos.

Pacientes con historia previa de arritmias cardiacas, úlcera péptica o gastritis, el dimenhidrinato debe administrarse con precaución.

Reducir dosis en pacientes con insuficiencia hepática.

En algunos pacientes se puede producir sedación.

Evitar la exposición a temperaturas muy altas y seguir unas medidas higiénico-dietéticas adecuadas, como una adecuada aireación e hidratación debido al riesgo de agravamiento del golpe de calor.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada al dimenhidrinato o difenhidramina.
Enfermedad de las vías respiratorias inferiores, por ejemplo, asma (controvertido).
Se han asociado a ataques agudos de porfiria y es considerado no seguro en estos pacientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.