Irbesartán, tableta, 150 mg, vía oral, código IGSS: 759

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hipertensión, para bajar la presión arterial. Tratamiento de la nefropatía diabética en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión, creatinina sérica elevada y proteinuria (>300 mg/día).

Reacciones adversas: Hiperpotasemia, mareos, infección del tracto respiratorio superior, hipotensión ortostática, fatiga, diarrea, dispepsia.

Precauciones de uso: Puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada, en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Oligohidramnios resultante puede asociarse con hipoplasia pulmonar fetal y deformaciones esqueléticas. Efectos adversos neonatales que incluyen hipoplasia craneal, anuria, hipotensión, insuficiencia renal y muerte.
Hipotensión en pacientes con depleción de volumen o de sal. Pacientes cuya función renal puede depender en parte de la actividad del sistema renina-angiotensina (p. ej., pacientes con estenosis de la arteria renal, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca o depleción de volumen) pueden correr un riesgo particular de desarrollar insuficiencia renal aguda o muerte. En estos pacientes vigilar la función renal periódicamente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. No coadministrar con aliskiren en pacientes con diabetes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.