Moxifloxacino Clorhidrato, solución oftálmica, 0.5 %, frasco gotero de 3 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 10529

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la conjuntivitis bacteriana causada por cepas susceptibles de los siguientes organismos: Estafilococo aureus, Estafilococo de la cabeza, Estafilococo epidermidis, Estafilococo haemolítico, Estafilococo hominis, steotococos neumonia
Haemophilus influenza, Propionibacterium acnés.

Reacciones adversas: Conjuntivitis, ojo seco, fiebre, aumento de la tos, infección, malestar ocular, hiperemia ocular, dolor ocular, prurito ocular, otitis media, faringitis, erupción, rinitis, hemorragia subconjuntival, lagrimeo.

Precauciones de uso: Causará daño al endotelio corneal si se introduce directamente hacia la cámara anterior del ojo, el uso prolongado puede provocar sobrecrecimiento de microorganismos no susceptibles; es importante no utilizar lentes de contacto si presentan signos o síntomas de conjuntivitis bacteriana.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las quinolonas y/o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.