Tobramicina, solución para inhalación, 300 mg/ 5 ml, vial o ampolla, 5 ml, Vía inhalación, código IGSS: 2124

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de larga duración de las infecciones pulmonares crónicas debidas a pseudomonas aeruginosa, en pacientes de 6 años de edad o mayores, con fibrosis quística.

Reacciones adversas: Alteración de la voz, mialgia, laringitis, acúfenos, epistaxis

Precauciones de uso: La tobramicina debe usarse con precaución en pacientes con sospecha o confirmación de alteración renal, auditiva, vestibular o neuromuscular, o con hemoptisis grave activa.
Los pacientes que reciben administración concomitante de este medicamento y terapia con aminoglucósidos parenterales deben ser monitoreados según sea clínicamente apropiado para detectar toxicidades asociadas con los aminoglucósidos como clase. Se deben controlar los niveles séricos de tobramicina.

Tobramicina debe utilizarse con extrema precaución en pacientes con trastornos neuromusculares como la enfermedad de Parkinson o miastenia gravis, ya que los aminoglucósidos pueden agravar la debilidad muscular a causa de su potencial efecto de tipo curare sobre la función neuromuscular.
efrotoxicidad no observada en estudios clínicos; se ha asociado con aminoglucósidos como clase; en pacientes con disfunción renal conocida o sospechada o que toman medicamentos nefrotóxicos concomitantes se deben obtener concentraciones séricas de tobramicina y mediciones de laboratorio de la

función renal a discreción del médico tratante; Si se desarrolla nefrotoxicidad, se debe tratar al paciente según sea médicamente apropiado, incluida la posibilidad de suspender el tratamiento.
La ototoxicidad se manifiesta como toxicidad auditiva y toxicidad vestibular y se ha notificado con aminoglúcosidos parenterales.
El tinnitus puede ser un síntoma centinela de ototoxicidad y, por lo tanto, la aparición de este síntoma justifica una mayor investigación clínica.
Con el uso de medicamentos inhalados puede aparecer tos. El uso de tobramicina en pacientes con hemoptisis clínicamente significativa debe realizarse o continuarse únicamente si los beneficios del tratamiento se considera que superan los riesgos de inducción de hemorragias posteriores.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo, a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, o a cualquier otro aminoglucósido.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.