Topiramato, tableta, 100 mg, vía oral, código IGSS: 763

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:
Epilepsia:
Monoterapia inicial para el tratamiento de la aparición parcial o primaria. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas en pacientes de 2 años de edad y mayores.
Terapia adyuvante para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial, primarias. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas y convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de 2 años de edad y mayores.
Tratamiento preventivo de la migraña en pacientes de 12 años de edad y mayores.

Reacciones adversas: Disminución del bicarbonato sérico, mareos, fatiga, ataxia, nerviosismo, parestesia, enlentecimiento psicomotor, visión anormal, anorexia, confusión, memoria disminuida, náuseas, trastorno del habla, lesión, dolor abdominal, pérdida de peso, diplopía, problemas de humor, faringitis, temblor, marcha anormal, apatía, astenia, boca seca, menorragia, trastorno de la piel, cambio de sabor, edema, hipertensión, síncope, bradicardia, palidez, angina de pecho, eritema, falla hepática, hipertermia, hipopotasemia, neuropatía, necrólisis epidérmica toxica.

Precauciones de uso: Puede provocar pérdida visual o defectos del campo visual permanente; discontinuar tan pronto como sea posible

Oligohidrosis e hipertermia por lo que es importante controlar la disminución de la sudoración y el aumento de temperatura corporal, especialmente en pacientes pediátricos.

Acidosis metabólica: medición basal y periódica de suero; se recomienda bicarbonato; considerar la reducción de la dosis o la suspensión del tratamiento si es clínicamente apropiado.

Los fármacos antiepilépticos aumentan el riesgo de comportamiento o ideación suicida, puede ocurrir depresión y problemas de humor.

El uso durante el embarazo puede causar importantes malformaciones como labio hendido y/o paladar hendido, y ser pequeño para la edad gestacional.

Se ha demostrado que disminuye la densidad mineral ósea y contenido mineral óseo en pacientes pediátricos.

Puede retrasar el aumento de estatura y aumento de peso; por lo que es importante monitorear cuidadosamente a los niños que reciben terapia prolongada.

Reacciones cutáneas graves: si se sospecha síndrome de Steven Johnson o necrosis epidérmica tóxica suspenda el tratamiento con topiramato.

Hiperamonemia/encefalopatía: mida el amoníaco si ocurren síntomas encefalopáticos.

Evite el uso con otros inhibidores de la anhidrasa carbónica, medicamentos que causan acidosis metabólica, o en pacientes con una dieta cetogénica ya que pueden ocasionar cálculos renales.

Se ha informado hipotermia con y sin hiperamonemia durante tratamiento con topiramato con uso concomitante de ácido valproico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.