Valerato de estradiol, tableta de 1 mg, envase calendario, vía oral, código IGSS: 2090

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Terapia hormonal sustitutiva para el tratamiento de los signos y síntomas ocasionados por el déficit estrogénico debido a la menopausia natural o a la castración.
En mujeres con útero intacto, la administración de estrógenos deberá acompañarse siempre de la administración secuencial de un progestágeno.

Reacciones adversas: Calambre abdominal, amenorrea, hinchazón, sangrado por disrupción, aumento de senos, sensibilidad en los senos, eyaculación retardada, depresión, boca seca, dolor de cabeza, hipertensión, impotencia, influenza, leucorrea, melasma, calambres musculares, náuseas, nerviosismo, edema periférico, polidipsia, prurito, erupción, hinchazón, irritación y enrojecimiento de la piel en el lugar de aplicación (transdérmico), punteo, síncope, dolor de muelas, malestar vaginal, erosión vaginal, ulceración vaginal, adherencia del anillo vaginal a la pared vaginal (Estring), vómitos, cambios de peso.

Precauciones de uso: Reacciones anafilácticas graves que incluyen urticaria, prurito, hinchazón de los labios, la lengua y la cara, compromiso respiratorio, dolor abdominal y vómitos durante el tratamiento transdérmico.
Mayor riesgo de accidente cerebrovascular y trombosis venosa profunda con la terapia con estrógeno solo y estrógeno más progestina.
Tenga precaución en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama o trombosis venosa profunda, depresión actual o previa, endometriosis, diabetes mellitus, hipertensión, cambios en la densidad mineral ósea, insuficiencia renal o

hepática, enfermedad metabólica ósea, lupus eritematoso sistémico; condiciones exacerbadas por la retención de líquidos.

Mayor riesgo de cáncer de ovario en mujeres que usaron terapia hormonal para los síntomas de la menopausia, cáncer de cuello uterino con el uso de anticonceptivos orales; sin embargo, el virus del papiloma humano sigue siendo el principal factor de riesgo de este cáncer. Mayor riesgo de cáncer de hígado con el uso de anticonceptivo oral, el riesgo aumenta con una mayor duración de uso.
Es importante la vigilancia clínica de todas las mujeres que utilizan terapia con estrógenos solos o combinados estrógenos más progestágenos; realizar medidas de diagnóstico adecuadas, incluido el muestreo de endometrio dirigido o aleatorio cuando esté indicado para descartar malignidad en mujeres posmenopáusicas con sangrado genital anormal persistente o recurrente no diagnosticado con etiología desconocida.
En pacientes con hipertrigliceridemia preexistente, la terapia con estrógenos puede estar asociada con elevaciones de los triglicéridos plasmáticos que conducen a pancreatitis y otras complicaciones.
Los pacientes que dependen de la terapia de reemplazo de hormona tiroidea y que también reciben estrógenos pueden necesitar dosis mayores de terapia de reemplazo de hormona tiroidea; A estos pacientes se les debe controlar la función tiroidea para mantener sus niveles de hormona tiroidea libre en un rango aceptable.
Puede ocurrir hipocalcemia inducida por estrógenos en mujeres con hipoparatiroidismo; considerar si los beneficios de la terapia con estrógenos superan los riesgos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada.
Reacción anafiláctica conocida o angioedema con emulsión tópica.
Deficiencia conocida de proteína C, proteína S o antitrombina u otro trastorno trombofílico conocido.
Cáncer de mama activo o previo.

Enfermedad tromboembólica arterial (accidente cerebrovascular, infarto de miocardio), tromboflebitis, trombosis venosa profunda, valvulopatía trombogénica.
Neoplasia dependiente de estrógenos.
Hipertensión no controlada, diabetes mellitus con afectación vascular, ictericia con uso previo de anticonceptivos orales.
Sangrado vaginal anormal no diagnosticado.
Enfermedad hepática, tumores hepáticos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.