Zinc Elemental, Jarabe 10 mg/5 ml frasco 120 ml, Vía oral, código IGSS: 2094

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: En condiciones que cursan con deficiencia de zinc, como el síndrome de mala absorción, quemaduras, heridas, retraso del crecimiento, hipogonadismo masculino, acrodermatitis enteropática y problemas sensoriales como la pérdida del gusto y el olfato. Dificultad adaptar la visión en la oscuridad. Inmunodeficiencias.

Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, irritación gástrica, elevaciones de la fosfatasa alcalina, amilasa y lipasa séricas que pueden volver a niveles altos normales dentro de 1 a 2 años de tratamiento, deterioro neurológico.

Precauciones de uso: La administración prolongada puede provocar anemia por deficiencia de cobre y neutropenia, debido a la competencia del cinc y el cobre al momento de absorberse por el tracto gastrointestinal.
Ha ocurrido sangramiento gástrico durante la terapia con zinc, en raras veces.
En los enfermos que reciben alimentación parenteral total deben verificarse las concentraciones séricas de oligoelementos durante dos meses o más.
Contiene etanol, tener precaución en pacientes con enfermedades hepáticas, alcoholismo, epilepsia, embarazo, lactancia y niños.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.