Ácido valproico (Valproato), jarabe o suspensión o solución oral de 250 mg/5 ml, frasco, 120 ml-200 ml, Código IGSS: 890

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Monoterapia y terapia adyuvante en:
Tratamiento de pacientes con convulsiones parciales complejas que ocurren de forma aislada o en asociación con otros tipos de convulsiones.
Tratamiento de crisis de ausencia simples y complejas, y como terapia adyuvante en pacientes con múltiples tipos de crisis que incluyen crisis de ausencia.

Reacciones adversas: Náuseas, dolor de cabeza, aumento del tiempo de sangrado, trombocitopenia, temblor, alopecia, astenia, infección, somnolencia, ambliopía, diarrea, diplopía, mareos, dispepsia, nistagmo, tinnitus, vómitos, ataxia, aumento del apetito, erupción, dolor abdominal, temblor, dolor de espalda, cambios de humor, ansiedad, confusión, marcha anormal, parestesia, alucinaciones, catatonía, disartria, discinesia tardía, vértigo, menstruaciones irregulares, aumento de peso

Precauciones de uso: Evaluar poblaciones de alto riesgo y monitorear pruebas hepáticas en suero debido al riesgo de hepatotoxicidad, especialmente en los primeros seis meses de tratamiento.
Defectos de nacimiento, disminución del coeficiente intelectual y trastornos del neurodesarrollo después de la exposición en el útero; no debe usarse para tratar a mujeres con epilepsia o trastorno bipolar que están embarazadas o que planean quedar embarazadas o para tratar a una mujer en edad fértil a menos que otros

medicamentos no hayan logrado proporcionar un control adecuado de los síntomas o sean inaceptables.

Pancreatitis puede aparecer en adultos o niños luego del inicio o tras años de tratamiento; si se diagnostica debe suspenderse.

Comportamiento o ideación suicida; los fármacos antiepilépticos, aumentan el riesgo de pensamientos o conductas suicidas, pacientes deben ser monitorizados por la aparición o empeoramiento de depresión, pensamientos o comportamientos suicidas o cualquier cambio en el comportamiento o temperamento.

Controlar los recuentos de plaquetas y las pruebas de coagulación debido al riesgo de sangrado y otros trastornos hematopoyéticos, como trombocitopenia relacionada a la dosis.

Puede ocurrir hiperamonemia y encefalopatía hiperamonémica; medir el nivel de amoníaco si hay letargo y vómitos inexplicables o cambios en el estado mental, y también con el uso concomitante de topiramato; considere la interrupción de la terapia con valproato.

Se ha informado hipotermia durante la terapia con valproato con o sin hiperamonemia asociada. Esta reacción adversa también puede ocurrir en pacientes que usan topiramato concomitante, considerar interrumpir el tratamiento.

Reacción a Medicamentos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos /reacción de hipersensibilidad multiorgánica que pueden ser fatales o amenazar la vida del paciente por lo que es importante discontinuar el tratamiento ante la aparición de signos o síntomas característicos.

Puede ocurrir somnolencia en los ancianos. La dosis del medicamento debe aumentarse lentamente y con un control regular de la ingesta nutricional y de líquidos.

Ha habido informes de infertilidad masculina coincidentes con la terapia con valproato; en estudios con animales, la administración oral en dosis clínicamente relevantes resultó en efectos reproductivos adversos en machos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Enfermedad hepática, insuficiencia hepática significativa.
Trastorno del ciclo de la urea
Trastornos mitocondriales causados por mutaciones en el ácido dexorribonucleico polimerasa-gamma mitocondrial (p. ej., síndrome de Alpers-Huttenlocher) y niños <2 años de edad que se sospecha que tienen un trastorno relacionado con polimerasa-gamma mitocondrial.
Prevención de la migraña en mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.