Bromoprida, cápsula, 10 mg, vía oral, código IGSS: 1992

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de nausea y vómitos incluyendo posoperativo. Disturbios de la motilidad gástrica. Reflujo gastroesofágico y preparación para endoscopias y estudios radiográficos del tracto gastrointestinal.

Reacciones adversas: Somnolencia, cansancio, inquietud, insomnio, cefalea, nausea, síntomas extrapiramidales, galactorrea, erupciones cutáneas.

Precauciones de uso: Se debe utilizar con precaución en pacientes con glaucoma, diabetes mellitus, enfermedad de Parkinson, insuficiencia renal y presión alta.
Debe utilizarse con precaución en pacientes alérgicos a los neurolépticos (antipsicóticos).
En pacientes con feocromocitoma puede desencadenar crisis hipertensivas.
En pacientes epilépticos puedes causar síndromes extrapiramidales.
La dosis podrá necesitar un ajuste en personas diabéticas ya que puede producir hipoglicemias.
Puede aumentar los niveles de prolactina, es importante utilizarlo con precaución en pacientes con Cáncer de mama.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al compuesto.
Pacientes con estimulación de la motilidad gastrointestinal como presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción intestinal mecánica, pacientes epilépticos que estén consumiendo drogas que causen efectos extrapiramidales, pacientes con feocromocitoma.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.