Colchicina, tableta 0.5 mg – 1 mg, vía oral, código IGSS: 946

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Profilaxis y el tratamiento de los brotes agudos de gota.
Tratamiento de la fiebre mediterránea familiar en adultos y niños de cuatro años o más.

Reacciones adversas: Efectos gastrointestinales (p. ej., diarrea, náuseas, calambres, dolor abdominal, vómitos), fatiga, gota, dolor faringolaríngeo, dolor de cabeza, toxicidad neuromuscular (p. ej., dolor muscular, debilidad), mielosupresión, coagulación intravascular diseminada, lesión de las células en los sistemas renal, hepático, circulatorio y nervioso central.

Precauciones de uso: Sobredosis fatales, tanto accidentales como intencionales, en adultos y niños que han ingerido colchicina.

Mielosupresión, leucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, pancitopenia y anemia aplásica con la colchicina utilizada en dosis terapéuticas.
Interacciones farmacológicas mortales y potencialmente mortales en pacientes con función renal normal tratados con colchicina administrada con P-gp e inhibidores potentes de citocromo (CYP3A4). Si es necesario el tratamiento concomitante con alguno de estos es posible que sea necesaria la modificación o interrupción de la dosis de colchicina.
Toxicidad neuromuscular inducida y rabdomiólisis con el tratamiento crónico en dosis terapéuticas.
En pacientes con disfunción renal y pacientes de edad avanzada, tienen un mayor riesgo.

Contraindicaciones: Los pacientes con insuficiencia renal o hepática no deben recibir colchicina junto con P-gp o inhibidores potentes del citocromo (CYP3A4) (esto incluye todos los inhibidores de la proteasa excepto fosamprenavir). En estos pacientes, se ha informado toxicidad por colchicina potencialmente mortal y fatal con colchicina tomada en dosis terapéuticas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.