Dexametasona, solución oftálmica, 0.1%, frasco gotero, 5 ml- 10 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 1234

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de las manifestaciones inflamatorias no infecciosas de las afecciones oculares que responden a los corticosteroides, tales como procesos inflamatorios no infecciosos de conjuntiva palpebral y bulbar, córnea y segmento anterior del ojo. Conjuntivitis primaveral y alérgica, episcleritis, escleritis, iritis, ciclitis e iridociclitis.

Reacciones adversas: Catarata, Hipertensión ocular, Glaucoma de ángulo abierto, daño al nervio óptico y defectos en la agudeza visual y el campo de visión (después de un uso prolongado), Picor ocular transitorio, ardor, irritación local, secreción ocular, malestar o dolor ocular, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, visión anormal/borrosa, prurito, formación de costras en el borde del párpado, sensación pegajosa, aumento de fibrina, ojo seco, edema conjuntival, tinción corneal, queratitis. , lagrimeo, edema, irritación, úlcera corneal, dolor en la frente, eritema del párpado, edema corneal, infiltrado, erosión corneal, midriasis, ptosis, queratitis puntiforme epitelial y posible malacia corneal o escleral, [cataratas subcapsulares posteriores] (uso prolongado).

Precauciones de uso: Puede incrementar la presión intraocular, especialmente en pacientes con antecedentes familiares de glaucoma, El uso prolongado de corticosteroides oftálmicos puede ocasionar hipertensión ocular y/o glaucoma, con deterioro del nervio óptico, disminuyendo la agudeza visual y causando defectos en el campo visual.

También puede producir catarata subcapsular posterior e infecciones fúngicas persistentes de la córnea.

Se puede producir síndrome de Cushing y/o supresión adrenal asociado a la absorción sistémica de dexametasona administrada por vía oftálmica, después de un tratamiento intensivo o continuado a largo plazo en pacientes predispuestos, incluidos niños y pacientes tratados con inhibidores del CYP3A4 (incluyendo ritonavir y cobicistat). Retrasar la cicatrización de heridas corneales; perforación corneal en pacientes con enfermedades que causan adelgazamiento de la córnea o esclerótica y riesgo de alteraciones visuales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad, enfermedades virales que incluyen queratitis epitelial por herpes simple, etapas infecciosas agudas de vaccinia, varicela y la mayoría de las otras enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva; infección micobacteriana del ojo y enfermedad fúngica de las estructuras oculares.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.