Pancreatina, Cápsula de liberación retardada, 10,000 UI, Vía oral, código IGSS: 2113

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina.

Reacciones adversas: Náuseas, diarrea, calambre abdominal, dolor de cabeza, dolor de cuello, congestión nasal, edema periférico, erupción, mareo, hipoglucemia, hiperglucemia, exacerbación de la diabetes mellitus, flatulencia, dispepsia, cálculos del tracto biliar, heces anormales, hidrocolecistis, quiste renal, infección viral, asma, gastritis, espasmo muscular.

Precauciones de uso: Se ha notificado el desarrollo de estenosis ileocecales y de colon (colonopatía fibrosante) en pacientes con fibrosis quística que toman dosis altas de preparados con pancreatina. A modo de precaución deben estudiarse clínicamente los síntomas abdominales no habituales o los cambios en los síntomas abdominales para excluir la posibilidad de que exista una colonopatía fibrosante, sobre todo si el paciente está tomando más de 10.000 unidades de lipasa/kg/día.
La administración del contenido de las cápsulas solo o mezclado con alimentos puede provocar irritación de la mucosa oral o pérdida de la actividad enzimática.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.