Teriflunomida, tableta, 14 mg, vía oral, código IGSS: 2123

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de formas recidivantes de esclerosis multiple.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, diarrea, alanina aminotransferasa aumentada, alopecia, gripe, náuseas, parestesia, fosfatemia, infección del tracto respiratorio superior, bronquitis, dolor abdominal superior, sinusitis, dolor musculoesquelético, hipertensión, dolor de muelas, ggt aumentada, ansiedad, mialgia, prurito, visión borrosa, cistitis, gastroenteritis viral, herpes bucal, neutropenia, aumento de aspartato transferasa, alergia estacional, sensación de ardor, palpitaciones, disminución de peso, disminución del recuento de neutrófilos, ciática, conjuntivitis, aumento de células blancas, acné, síndrome del túnel carpiano, leucopenia, distensión abdominal, muerte cardiovascular

Precauciones de uso: Lesión hepática clínicamente significativa y potencialmente mortal, incluida insuficiencia hepática aguda que requiere trasplante. El uso concomitante de teriflunomida con otros fármacos hepatotóxicos puede aumentar el riesgo de lesión hepática grave.
Importante obtener los niveles de transaminasas y bilirrubina dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la terapia con teriflunomida. Controle los niveles de alanina aminotransferasa al menos una vez al mes durante seis meses después de comenzar con teriflunomida.
Si se sospecha una lesión hepática inducida por fármacos, suspenda teriflunomida y comience un procedimiento de eliminación acelerada con colestiramina o carbón.
Los pacientes con enfermedad hepática preexistente pueden tener un mayor riesgo de desarrollar transaminasas séricas elevadas.

Excluir el embarazo antes del inicio del tratamiento con teriflunomida en mujeres con potencial reproductivo. Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con teriflunomida y durante un procedimiento de eliminación acelerada del fármaco.
Detenga el tratamiento con teriflunomida y utilice un procedimiento de eliminación acelerada del fármaco si la paciente queda embarazada.

Contraindicaciones: Antecedentes de reacción de hipersensibilidad a teriflunomida, leflunomida o excipientes.
Insuficiencia hepática grave.
Embarazo o pacientes femeninas sin administración de anticonceptivos.
Tratamiento actual con leflunomida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.