Alfa-Metildopa, tableta 250 mg, vía oral, código IGSS: 2039

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la hipertensión.

Reacciones adversas: Angina de pecho, bradicardia, hipotensión ortostática, depresión, mareo, letargo, sedación, erupción, ginecomastia, impotencia, boca seca, náuseas, vómitos, anemia hemolítica, trombocitopenia, toxicidad hepática, artralgia, enfermedad autoinmune, síndrome similar al lupus.

Precauciones de uso: Insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes en diálisis (mayor riesgo de hipertensión después del procedimiento), edema, anemia hemolítica, hipotensión, accidente cerebrovascular bilateral grave, antecedentes de enfermedad hepática.
Evite la retirada abrupta.
Riesgo de disminución de la libido e impotencia en los hombres.
Puede afectar la capacidad para realizar tareas peligrosas.
Se desarrolla tolerancia con el tratamiento prolongado, especialmente si no se administra ningún diurético concurrente (la metildopa causa retención de sodio y agua). Interfiere con algunas pruebas de laboratorio.
NO se recomienda vía intramuscular/subcutáneo debido a la absorción errática.

Contraindicaciones: Enfermedad hepática activa, como hepatitis aguda y cirrosis activa, trastornos hepáticos asociados con el tratamiento previo con metildopa
Hipersensibilidad a la metildopa u otros ingredientes (p. ej., sulfitos)
Feocromocitoma.
Administración concomitante con inhibidores de la monoaminooxidasa.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.