Cefixima, tableta o cápsula, 400 mg, vía oral, código IGSS: 48

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de adultos y pacientes pediátricos de seis meses de edad o mayores con:
Infecciones del tracto urinario no complicadas causadas por aislados susceptibles de escherichia coli y proteus mirabilis.
Otitis media causada por aislamientos susceptibles de Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis.
Faringitis y amigdalitis causadas por aislamientos susceptibles de Streptococcus pyogenes.
Exacerbaciones agudas de bronquitis crónica causadas por aislados susceptibles de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Gonorrea no complicada (cervical/uretral) causada por aislados susceptibles de Neisseria gonorrhoeae (aislados productores de penicilinasa y no productores de penicilinasa).

Reacciones adversas: Diarrea, dolor abdominal, candidiasis, mareo, dispepsia, transaminasas elevadas, eosinofilia, eritema multiforme, fiebre, flatulencia, dolor de cabeza, aumento del nitrógeno ureico en sangre, aumento de creatinina, leucopenia, náuseas, tiempo de protrombina prolongado, prurito, colitis pseudomembranosa, erupción, reacción similar a la enfermedad del suero, síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia, urticaria, vaginitis, vómitos.

Precauciones de uso: Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile con el uso de casi todos los antibacterianos, hasta dos meses después de la administración y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De ocurrir, suspender el tratamiento.
Pacientes en diálisis deben controlarse cuidadosamente.
Las cefalosporinas, pueden estar asociadas con una caída en la actividad de la protrombina por lo que el tiempo de protrombina debe ser monitoreado en riesgo.
Puede contener aspartame una fuente de fenilalanina dentro de los excipientes por lo que debe tenerse precaución en pacientes con fenilcetonuria.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a cefixima u otras cefalosporinas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.