Fluorometolona, suspensión oftálmica, 0.1 %, frasco gotero, 5 ml - 10 ml, vía tópico ocular, código IGSS: 1214

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de afecciones inflamatorias de la conjuntiva palpebral y bulbar, córnea y segmento anterior del ojo que responden a esteroides.

Reacciones adversas: Frecuencia no definida: Glaucoma, catarata, potenciar la súper infección, curación lenta de heridas, hipercorticoidismo (raro), reacciones alérgicas, sensación de cuerpo extraño, eritema del párpado, edema de párpado/hinchazón de ojos, secreción ocular, dolor de ojo, prurito ocular, aumento de lagrimeo, erupción, perversión del gusto, alteración visual (visión borrosa), defecto del campo visual.

Precauciones de uso: Únicamente para uso tópico ocular. El uso prolongado puede provocar glaucoma, daño al nervio óptico, defecto en la agudeza visual y el campo visual, formación de cataratas y/o puede ayudar en el establecimiento de infecciones oculares secundarias por patógenos debido a supresión de la respuesta del huésped. Infecciones purulentas agudas del ojo pueden enmascararse o exacerbarse, pueden retardar la cicatrización de la herida corneal. Posible perforación de la córnea o esclerótica con el uso crónico de esteroides tópicos. Se debe controlar la presión intraocular si se utiliza por más de 10 días.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de la formulación. Queratitis por herpes simple, infecciones oculares por hongos o micobacterias

Infecciones purulentas agudas no tratadas. Vaccinia, varicela y la mayoría de las otras enfermedades virales de la córnea y la conjuntiva.

Cataratas, glaucoma, infección oftálmica.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.