Metoclopramida, tableta o cápsula 10 mg, vía oral, código IGSS:149

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento para pacientes con diagnóstico de reflujo gastroesofágico documentado sintomát ico en adultos que no responden a la terapia convencional.
Alivio de los síntomas en adultos con gastroparesia diabética aguda y recurrente.

Reacciones adversas: Síntomas extrapiramidales (reacciones distónicas en el 25% de los adultos jóvenes de 18 a 30 años)**,** fatiga, inquietud, sedación, dolor de cabeza, mareos, somnolencia.

Precauciones de uso: No se recomienda el uso en niños debido al riesgo de discinesia tardía.
Metoclopramida puede causar discinesia tardía, otros síntomas extrapiramidales y síndrome neuroléptico maligno. Evitar el uso concomitante con medicamentos que pueden causar estos síntomas además en pacientes con enfermedad de Parkinson.
Pacientes con historia de diagnóstico de depresión debido a la posible aparición de ideación suicida.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a metoclopramida o procainamida.
Antecedentes de discinesia tardía o una reacción distónica a la metoclopramida.
Cuando la estimulación de la motilidad gastrointestinal puede ser peligrosa (p. ej., en presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación).
Presencia de feocromocitoma u otros paragangliomas liberadores de catecolaminas.
Pacientes con antecedentes de epilepsia.

Otros fármacos que causan síntomas extrapiramidales (p. ej., fenotiazinas, butirofenonas).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.