Valproato sódico, tableta de liberación retardada, 500 mg, vía oral, código IGSS: 854

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la epilepsia parcial o generalizada:
Epilepsia generalizada primaria: convulsiva (clónica, tónica, tónico-clónica, mioclónica) y no convulsiva o crisis de ausencias.
Epilepsia parcial: convulsiones simples o complejas.
Convulsiones generalizadas secundarias.
Tratamiento de convulsiones mixtas y generalizadas idiopáticas y/o epilepsia generalizada sintomática (West y Lennox-Gastaut).
Tratamiento de los episodios maníacos en el trastorno bipolar, cuando el litio está contraindicado o no se tolera. Debe sopesarse la continuación del tratamiento después del episodio maníaco en los pacientes que han respondido a valproato para la manía aguda.

Reacciones adversas: Náuseas, dolor de cabeza, aumento del tiempo de sangrado, trombocitopenia, temblor, alopecia, astenia, infección, somnolencia, ambliopía, diarrea, diplopía, mareos, dispepsia, nistagmo, tinnitus, vómitos, ataxia, aumento del apetito, erupción, dolor abdominal, temblor, dolor de espalda, cambios de humor, ansiedad, confusión, marcha anormal, parestesia, alucinaciones, catatonía, disartria, discinesia tardía, vértigo, menstruaciones irregulares, aumento de peso.

Precauciones de uso: Evaluar poblaciones de alto riesgo y monitorear pruebas hepáticas en suero debido al riesgo de hepatotoxicidad, especialmente en los primeros seis meses de tratamiento.

Defectos de nacimiento, disminución del coeficiente intelectual y trastornos del neurodesarrollo después de la exposición en el útero; no debe usarse para tratar a mujeres con epilepsia o trastorno bipolar que están embarazadas o que planean quedar embarazadas o para tratar a una mujer en edad fértil a menos que otros medicamentos no hayan logrado proporcionar un control adecuado de los síntomas o sean inaceptables.

Pancreatitis puede aparecer en adultos o niños luego del inicio o tras años de tratamiento; si se diagnostica debe suspenderse el tratamiento.

Comportamiento o ideación suicida; los fármacos antiepilépticos, aumentan el riesgo de pensamientos o conductas suicidas, pacientes deben ser monitorizados por la aparición o empeoramiento de depresión, pensamientos o comportamientos suicidas o cualquier cambio en el comportamiento o temperamento.

Controlar los recuentos de plaquetas y las pruebas de coagulación debido al riesgo de sangrado y otros trastornos hematopoyéticos, como trombocitopenia relacionada a la dosis.

Puede ocurrir hiperamonemia y encefalopatía hiperamonémica; medir el nivel de amoníaco si hay letargo y vómitos inexplicables o cambios en el estado mental, y también con el uso concomitante de topiramato; considere la interrupción de la terapia con valproato.

Se ha informado hipotermia durante la terapia con valproato con o sin hiperamonemia asociada. Esta reacción adversa también puede ocurrir en pacientes que usan topiramato concomitante, considerar interrumpir el tratamiento.

Reacción a Medicamentos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos /reacción de hipersensibilidad multiorgánica que pueden ser fatales o amenazar la vida del paciente por lo que es importante discontinuar el tratamiento ante la aparición de signos o síntomas característicos.

Puede ocurrir somnolencia en los ancianos. La dosis del medicamento debe aumentarse lentamente y con un control regular de la ingesta nutricional y de líquidos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.
Enfermedad hepática, insuficiencia hepática significativa.
Trastorno del ciclo de la urea
Trastornos mitocondriales causados por mutaciones en el ADN polimerasa-gamma mitocondrial (POLG; p. ej., síndrome de Alpers-Huttenlocher) y niños <2 años de edad que se sospecha que tienen un trastorno relacionado con POLG.
Prevención de la migraña en mujeres embarazadas o que planean quedar embarazadas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.