Diclofenaco sódico, solución oftálmica, 0.1 %, frasco gotero, 10 ml. Vía tópico ocular, código IGSS: 1383

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la inflamación postoperatoria en pacientes que se han sometido a extracción de cataratas y para el alivio temporal del dolor y la fotofobia en pacientes sometidos a cirugía refractiva corneal.

Reacciones adversas: Picor ocular leve, irritación; puede retardar la cicatrización de heridas corneales, lagrimeo, aumento de la presión intraocular, queratitis, mareo, insomnio, dolor, fiebre, escalofríos, náuseas vómitos, dolor abdominal, depósitos corneales, edema corneal, conjuntivitis, irritación, hinchazón del párpado, perforación corneal, adelgazamiento corneal.

Precauciones de uso: Los pacientes deben ser monitoreados durante un año después del uso en pacientes sometidos a procedimientos refractivos corneales, posibilidad de un aumento del tiempo de sangrado debido a la interferencia con la agregación de trombocitos y sensibilidad cruzada al ácido acetilsalicílico, derivados del ácido fenilacético, y otros agentes antiinflamatorios no esteroideos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos o componentes de la formulación.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.