Estrógenos conjugados, crema vaginal 0.625 mg/ g, tubo con aplicador 40 g – 45 g, vía tópico vaginal, código IGSS: 1003

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la atrofia vulvovaginal y dispareunia moderada a severa asociada a la menopausia.

Reacciones adversas: Dolor de mama, dolor de cabeza, dolor pélvico, trastorno vulvovaginal, vasodilatación, leucorrea, moniliasis, dolor, calambres musculares, prurito, disuria, hemorragia vaginal, vaginitis, dolor abdominal, mareo, aumento de senos, urgencia urinaria.

Precauciones de uso: La monoterapia con estrógenos en mujeres no histerectomizadas hay un mayor riesgo de cáncer de endometrio. Se asocia también con el aumento del riesgo de accidentes cerebrovascular y trombosis venosa profunda. Un mayor riesgo de desarrollar demencia principalmente en mujeres mayores de 65 años o que utilizan el tratamiento por más de 5.2 años.
No deben ser usados para la prevención de enfermedades cardiovasculares o demencia.
El uso de estrógenos conjugados más acetato de medroxiprogesterona presentan un mayor riesgo de cáncer de mama y de ovario.
Relacionado con patologías de la vesícula biliar, que requieren cirugía.
En presencia de pérdida repentina parcial o completa de la visión o repentina aparición de proptosis, diplopía o migraña, se deberá interrumpir el tratamiento y evaluar la causa. Si el examen oftalmológico revelara papiledema o lesiones retinovasculares, deberá suspenderse el tratamiento.

Está asociado a hipercalcemia severa en pacientes con cáncer de mama y metástasis ósea.

Elevación de triglicéridos, por lo que se debe vigilar a pacientes con hipertrigliceridemia por el riesgo de desarrollar pancreatitis.

Puede causar retención hídrica, por lo que se debe vigilar a las pacientes con insuficiencia cardiaca o renal.

Puede provocar exacerbación del asma, epilepsia, migraña con o sin aura, diabetes mellitus, endometriosis, porfiria, lupus eritematoso sistémico y hemangiomas hepáticos, deberá emplearse con precaución en mujeres con dichas afecciones.

Administrarse con precaución en pacientes con hipoparatiroidismo ya que los mismos pueden predisponer a una hipocalcemia severa.

Pueda reducir o contribuir al fracaso de los preservativos, diafragmas o capuchón cervical de látex o goma.

La administración continua a largo plazo de estrógenos naturales y sintéticos de determinadas especies animales aumenta la frecuencia de carcinomas de mama, útero, cuello uterino, vagina, testículos e hígado.

Contraindicaciones: Embarazo conocido o sospechado,sangrado uterino anormal no diagnosticado, cáncer de mama diagnosticado sospechado o con antecedentes, neoplasia estrógeno-dependiente diagnosticada o sospechada, presencia o antecedentes de accidente cerebro vascular infarto de miocardio, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, reacción anafiláctica, disfunción o enfermedad hepática activa o crónica, trastornos trombofílicos conocidos (por ejemplo, deficiencia de proteína C, proteína So antitrombina), hipersensibilidad conocida o sospechada a sus componentes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.