Hidralazina clorhidrato, solución inyectable o polvo para inyección, 20 mg/ ml, vial o ampolla, 1 ml, vía IV, código IGSS: 619

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Hipertensión esencial severa, cuando no sea posible la vía oral o se precise urgentemente disminuir la presión sanguínea. Preeclampsia y eclampsia.

Reacciones adversas: Hipotensión, palpitaciones, conjuntivitis, taquicardia, dolor de cabeza, edema periférico, colapso vascular, neuropatía periférica, anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, reacción psicótica, agranulocitosis, leucopenia, hepatotoxicidad, dolor en el pecho, disnea, congestión nasal, íleo paralítico, disurea, trombocitopenia, neuritis periférica, artritis reumatoide, agranulocitosis, artralgia, síndrome de lupus eritematoso sistémico.

Precauciones de uso: Cuando se usan otros antihipertensivos potentes por vía parenteral, tales como el diazóxido, en combinación con la hidralazina se debe observar a los pacientes continuamente y durante varias horas con el fin de detectar un posible descenso excesivo en la presión sanguínea. Los inhibidores de la monoaminooxidasa deben usarse con precaución en pacientes bajo tratamiento con hidralazina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la hidralazina.
Taquicardia.
Arteriopatía coronaria.
Cardiopatía reumática de la válvula mitral.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.