Leflunomida, tableta, 20 mg, vía oral, código IGSS: 10417

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide y artritis psoriásica activa.

Reacciones adversas: Diarrea, infecciones respiratorias, alopecia, hipertensión, erupción, náuseas, bronquitis, dolor de cabeza, dolor abdominal, LFT anormales, lesión accidental, dolor de espalda, dispepsia, infección del tracto urinario, mareos, infección, trastorno articular, prurito, pérdida de peso, anorexia, tos, gastroenteritis, faringitis, estomatitis, tenosinovitis, vómitos, debilidad, reacción alérgica, dolor de pecho, piel seca, eccema, dolor, parestesia, neumonía, rinitis, sinusitis, sinovitis.

Precauciones de uso: Los usuarios de leflunomida pueden presentar infecciones graves (incluyendo sepsis), pancitopenia, agranulocitosis y trombocitopenia. No comiencar tratamiento con leflunomida en pacientes con infección activa. Realizar control de toxicidad embriofetal.
Los usuarios pueden presentar Síndorme de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Aparecimiento de neuropatía periférica. Enfermedad pulmonar intersticial. Aumento de la presión arterial. Enfermedades malignas y linfoproliferativas. Se han notificado artralgias graves e incapacitantes en pacientes que toman inhibidores de DPP-4; considerarlo como una posible causa de dolor articular severo y suspender el medicamento si corresponde.

Contraindicaciones: Embarazo, puede causar daño fetal.
Pacientes con insuficiencia hepática grave.

Pacientes con hipersensibilidad conocida a la leflunomida o a cualquiera de los demás componentes.
Pacientes en tratamiento con teriflunomida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.