Levetiracetam, tableta, 500 mg, vía oral, código IGSS: 2104

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de convulsiones de inicio parcial en pacientes de 1 mes de edad y mayores.
Terapia adyuvante para el tratamiento de convulsiones mioclónicas en pacientes de 12 años de edad y mayores con epilepsia mioclónica juvenil.
Terapia adyuvante para el tratamiento de convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias en pacientes 6 años de edad y mayores con epilepsia generalizada idiopática.

Reacciones adversas: Astenia, dolor de cabeza, infección, aumento de la presión arterial (17% en niños < 4 años), somnolencia, fatiga, anorexia, debilidad, nasofaringitis, tos, infección viral, asma, mareos, nerviosismo, amnesia, ansiedad, ataxia, depresión, hostilidad, parestesia, sinusitis, diplopía, ambliopía, conjuntivitis, albuminuria, pruebas de función hepática anormales, discinesia, eczema, neutropenia, disminución del hematocrito, leucopenia, tendencias suicidas, hepatitis, pancreatitis, supresión de la médula ósea, necrólisis epidérmica.

Precauciones de uso: Alteraciones del comportamiento, incluidos síntomas psicóticos, ideación suicida, se ha observado irritabilidad y comportamiento agresivo.
Comportamiento e ideación suicida: controle a los pacientes para detectar nuevos o empeoramientos depresión, pensamientos/comportamientos suicidas y/o cambios inusuales en el estado de ánimo o comportamiento.

Controle la somnolencia, la fatiga, la ataxia, la marcha anormal e incoordinación. Aconseje a los pacientes que no conduzcan u operen maquinaria hasta que hayan adquirido suficiente experiencia con el consumo de levetiracetam.
A la primera señal de erupción o reacciones dermatológicas graves suspenda levetiracetam, a menos que claramente no esté relacionado con el medicamento.
Pueden aparecer convulsiones por retiro, por lo que levetiracetam debe retirarse gradualmente.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.