Metoclopramida, solución inyectable, 5 mg/ ml, ampolla 2 ml, vía Intramuscular o intravenosa, código IGSS: 233

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Alivio de los síntomas asociados con estasis gástrica diabética aguda y recurrente.
Profilaxis de los vómitos asociados con quimioterapia contra el cáncer emetogénico.
Profilaxis de náuseas y vómitos postoperatorios en aquellas circunstancias en las que la succión nasogástrica no es deseable.
Facilitar la intubación del intestino delgado en adultos y pacientes pediátricos pacientes en los que la sonda no pasa por el píloro con maniobras convencionales.

Utilizado para estimular el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal de bario en casos en los que el retraso en el vaciado interfiere con el examen radiológico del estómago y/o intestino delgado.

Reacciones adversas: Síntomas extrapiramidales (reacciones distónicas en el 25% de los adultos jóvenes de 18 a 30 años), fatiga, inquietud, sedación, dolor de cabeza, mareos, somnolencia.

Precauciones de uso: No se recomienda el uso en niños debido al riesgo de discinesia tardía.
Metoclopramida puede causar discinesia tardía, otros síntomas extrapiramidales y síndrome neuroléptico maligno. Evitar el uso concomitante con medicamentos que pueden causar estos síntomas además en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Pacientes con historia de diagnóstico de depresión debido a la posible aparición de ideación suicida.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a metoclopramida o procainamida.
Antecedentes de discinesia tardía o una reacción distónica a la metoclopramida.
Cuando la estimulación de la motilidad gastrointestinal puede ser peligrosa (p. ej., en presencia de hemorragia gastrointestinal, obstrucción mecánica o perforación).
Presencia de feocromocitoma u otros paragangliomas liberadores de catecolaminas.
Pacientes con antecedentes de epilepsia.
Otros fármacos que causan síntomas extrapiramidales (p. ej., fenotiazinas, butirofenonas).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.