Rivastigmina, cápsula, 1.5 mg, Vía oral, código IGSS: 857

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la demencia leve a moderada del tipo Alzheimer.
El tratamiento de la demencia leve a moderada asociada con la enfermedad de Parkinson.

Reacciones adversas: Náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor de cabeza, anorexia, dolor abdominal, disminución de peso, insomnio, ansiedad, astenia, vértigo, fatiga.

Precauciones de uso: Puede provocar reacciones adversas gastrointestinales que pueden incluir náuseas, vómitos, diarrea, anorexia/disminución del apetito y pérdida de peso, y puede requerir interrupción del tratamiento. La deshidratación puede resultar de vómitos prolongados o diarrea y puede estar asociada con resultados graves.
Dermatitis alérgica diseminada, que puede ocurrir después de la administración oral o transdérmica.
Si se sospecha de dermatitis alérgica de contacto después del uso transdérmico de rivastigmina, cambiar el tratamiento a la vía oral después de pruebas alérgicas negativas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la rivastigmina o los carbamatos.
Historial de reacción en el lugar de aplicación con parche transdérmico
Sangrado gastrointestinal activo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.