Temozolamida, cápsula, 100 mg, vía oral, código IGSS: 207

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes adultos con glioblastoma recién diagnosticado concomitantemente con radioterapia y luego como tratamiento de mantenimiento.
Tratamiento de pacientes adultos con astrocitoma anaplásico refractario que han experimentado la progresión enfermedad en un régimen de medicamentos que contiene nitrosourea y procarbazina.

Reacciones adversas: Alopecia, linfopenia, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, estreñimiento, anorexia, convulsiones, trombocitopenia, erupción, hemiparesia, diarrea, neutropenia, fiebre, astenia, mareos, edema periférico, infecciones virales, amnesia, insomnio, dolor abdominal, ataxia, dolor de espalda, paresia, infección de las vías respiratorias superiores, incontinencia urinaria, infección del tracto urinario, visión anormal, prurito, dolor de mamas, depresión, confusión, mialgia, aumento de peso, anemia, eritema

Precauciones de uso: Controlar el recuento absoluto de neutrófilos y el recuento de plaquetas antes de cada ciclo y durante el tratamiento debido al riesgo de mielosupresion. Los pacientes geriátricos y las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar mielosupresión.
Se ha observado el desarrollo de leucemia mieloide en pacientes que usan o han utilizado temozolomide.
Controle de cerca a todos los pacientes, particularmente aquellos que reciben esteroides, por el posible desarrollo de linfopenia y neumonía por pneumocistis.

Se han notificado casos de hepatotoxicidad mortal y grave por lo que es importante realizar pruebas hepáticas al inicio, a la mitad del primer ciclo, antes a cada ciclo subsiguiente, y aproximadamente de 2 a 4 semanas después de la última dosis de temozolomide.
Puede causar toxicidad embriofetal. Aconsejar a las mujeres de potencial reproductivo del riesgo potencial para el feto y para usar anticoncepción eficaz. Aconseje a los pacientes masculinos con parejas embarazadas o parejas femeninas con potencial reproductivo a usar preservativos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a temozolomide y dacarbazina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.