Donepecilo Clorhidrato, tableta, 10 mg, Vía oral, código IGSS:10407

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento indicado en el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer de leve a moderadamente grave.

Reacciones adversas: Náuseas, diarrea, insomnio, accidente, infección, dolor de cabeza, vómitos, calambres, fatiga, anorexia, hipertensión, sueños anormales, alucinaciones, confusión, síncope.

Precauciones de uso: Riesgo de hemorragia gastrointestinal, especialmente en pacientes con antecedentes de úlcera gástrica o aquellos que toman antiinflamatorios no esteroideos.
Es probable que los inhibidores de la colinesterasa exageren la relajación muscular de tipo succinilcolina durante la anestesia.
Los inhibidores de la colinesterasa pueden tener efectos vagotónicos en los ganglios sinoauriculares y auriculoventriculares que se manifiestan como bradicardia o bloqueo cardíaco.
Puede provocar vómitos (mayor riesgo con dosis de 23 mg/día)
Puede causar anorexia y/o pérdida de peso (dependiente de la dosis)
Los colinomiméticos pueden causar obstrucciones del flujo de salida de la vejiga.
Se cree que los colinomiméticos tienen cierto potencial para causar convulsiones generalizadas.
Los inhibidores de la colinesterasa deben prescribirse con precaución en caso de antecedentes de asma o enfermedad pulmonar obstructiva.

Úselo con precaución en pacientes con antecedentes de trastornos convulsivos, obstrucción del tracto urinario, úlcera péptica, anomalías de la conducción cardíaca o enfermedades respiratorias, incluida la enfermedad obstructiva crónica o el asma.
Puede estar asociado con prolongación del intervalo QT y torsades de pointes; tenga precaución en pacientes con riesgo de repolarización cardíaca
Se han notificado casos raros de síndrome neuroléptico maligno; Puede considerar suspender el tratamiento si se presentan síntomas.
Se han notificado casos raros de rabdomiólisis después de unos meses de tratamiento o después del inicio del tratamiento; tenga precaución en pacientes con factores de riesgo de rabdomiólisis, incluidos medicamentos asociados con rabdomiólisis; considerar la interrupción del tratamiento si se produce una marcada elevación de los niveles de CPK o síntomas que sugieran rabdomiolisis.
Los pacientes con bajo peso <55 kg pueden experimentar más pérdida de peso, náuseas y vómitos que los pacientes >55 kg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al donepezilo o a los derivados de la piperidina.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.