Medroxiprogesterona, tableta 5 mg, vía oral, código IGSS: 316

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento coadyuvante a la terapia estrogénica en mujeres menopáusicas no histerectomizadas, amenorrea secundaria, menometrorragia funcional, esterilidad, Síndrome premenstrual, dismenorrea, endometriosis de leve a moderada.

Reacciones adversas: Sangrado uterino disfuncional, dolor de cabeza, aumento de peso, amenorrea, vaginitis, incluyendo candidiasis y bacteriana, dolor abdominal, infecciones del tracto urinario, acné, depresión, disminución de la libido, náuseas, dolor de espalda, dolor/sensibilidad en los senos, fatiga, ansiedad, irritabilidad, mareos, bulto en el pecho, anemia, hipersensibilidad a las drogas, disminución de peso, retención de líquidos, parálisis facial, síncope, parestesia, somnolencia, taquicardia, sofocos, asma, disnea, diarrea, distensión abdominal, urticaria, prurito, piel seca, dismenorrea, galactorrea, dispareunia, dolor en el pecho, sangrado por disrupción, punteo, cambio en el flujo menstrual, amenorrea, cambios en la erosión cervical y las secreciones cervicales, sensibilidad mamaria y galactorrea, disfunción eréctil, dolor de cabeza, mareo, somnolencia, convulsiones, nerviosismo, euforia, depresión mental, insomnio, edema, pirexia, fatiga, malestar, cambio de peso, ictericia colestásica, reacciones de sensibilidad de la piel, acné, alopecia, hirsutismo, erupción alérgica con y sin prurito, reacciones anafilactoides, angioedema, náuseas, efectos similares a los corticoides, hipercalcemia.

Precauciones de uso: Antes del inicio del tratamiento excluir la presencia de neoplasia genital o mamaria.

En caso de hemorragia o sangrado vaginal irregular, debe considerarse la posibilidad de causas no funcionales y realizar su diagnóstico etiológico antes de comenzar el tratamiento.
Efectuar control ginecológico cada seis meses.
Control de diabetes, depresión, antecedente de infarto de miocardio o cerebral y de hipertensión arterial.
Administrar con precaución a las pacientes en las que la retención de líquidos pueda agravar su situación: pacientes con historial de epilepsia o migrañas, asma y alteraciones cardiacas o renales.
Suspender si se sospecha de trastornos tromboembólicos, pérdida súbita o parcial de la visión, diplopía, hemicránea, edema de la papila y lesiones vasculares de la retina.
Precaución en su administración en pacientes tratadas por endometriosis ya que puede presentarse sangrado abundante.
Puede alterar parámetros de: Esteroides plasmáticos/urinarios: cortisol, estrógeno, pregnadediol, progesterona, testosterona. Gonadotropinas plasmáticas/urinarias: LH y FSH. Y globulina ligadora de hormona sexual. Se recomienda avisar al histopatólogo y analista.
Precaución en pacientes diabéticas ya que contiene sacarosa.
La edad no representa un factor limitante de la terapia.
Puede enmascarar la aparición del climaterio.
Su uso puede incrementar su riesgo de osteoporosis a lo largo de la vida. Se recomienda evaluación de la densidad mineral ósea.
Se recomienda una adecuada ingesta de calcio y vitamina D.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida al acetato de medroxiprogesterona o a cualquiera de sus excipientes. Tromboflebitis y fenómenos tromboembólicos, hipertensión arterial grave, insuficiencia hepática grave, aborto diferido, hemorragia vaginal o del tracto urinario no diagnosticada, patología mamaria no diagnosticada y enfermedad o

sospecha de malignidad mamaria, en caso de sospecha de embarazo, neoplasia dependiente de estrógenos o progesterona, deterioro o enfermedad hepática conocida.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.