# Pilocarpina clorhidrato, solución oftálmica, 4%, frasco gotero, 15 ml

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Reducción de la presión intraocular elevada en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular, manejo del glaucoma agudo de ángulo cerrado, prevención de la presión intraocular elevada posoperatoria asociada con la cirugía láser e inducción de miosis.

**Reacciones adversas:** Dolor de cabeza/dolor de cejas, cambio acomodaticio, visión borrosa, irritación de ojo, discapacidad visual (visión tenue, oscura o "saltando"), dolor de ojo, hiperemia conjuntival, visión borrosa, dolor de ojo, discapacidad visual, irritación de ojo, aumento del lagrimeo.

**Precauciones de uso:** Conducción nocturna y otras situaciones peligrosas, ocupaciones con poca iluminación, los mióticos pueden causar espasmo de acomodación; no utilizar cuando hay iritis presente, en pacientes pediátricos con glaucoma congénito primario para el control de presión intraocular o con diagnóstico de glaucoma secundario al segmento anterior; tampoco se recomienda en pacientes con disgenesia o uveítis (especialmente si la uveítis es activa) ni utilizar lentes de contacto durante el tratamiento.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.