Pregabalina, Tableta o Cápsula, 75 mg, vía oral, código IGSS: 10582

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Manejo del dolor neuropático asociado a la neuropatía periférica por diabetes.
Manejo de la neuralgia posherpética.
Terapia adyuvante para el tratamiento de convulsiones de inicio parcial en pacientes de 1 mes de edad y mayores.
Manejo de la fibromialgia.
Manejo del dolor neuropático asociado con lesión de la médula espinal.

Reacciones adversas: Mareos, somnolencia (letargo, lentitud, hipersomnia), edema periférico, ataxia, fatiga, xerostomía, aumento de peso, temblor, visión borrosa, diplopía, astenia, edema, edema facial, hipotensión, neuropatía, dolor, desorientación, estreñimiento, aumento de peso, lesión accidental, pensamiento anormal, confusión, amnesia, vértigo, adicción, anemia, diarrea, ginecomastia y aumento de mamas, epididimitis, esofagitis, dismenorrea, distonía, insuficiencia cardiaca, hirsutismo, uveítis.

Precauciones de uso: Se puede producir angioedema (p. ej., hinchazón de la garganta, la cabeza y el cuello), y puede estar asociado con compromiso respiratorio potencialmente mortal
que requieren tratamiento de emergencia.
Suspender pregabalina inmediatamente si las reacciones de hipersensibilidad (p. ej., urticaria, disnea y sibilancias) pueden ocurrir.

Los medicamentos antiepilépticos, incluido pregabalina, aumentan el riesgo de suicidio pensamientos o conductas.
Puede ocurrir depresión respiratoria cuando se utiliza pregabalina con depresores del SNC concomitantes o en el marco de una enfermedad respiratoria subyacente. Vigile a los pacientes y ajuste la dosis según corresponda.
Puede causar mareos y somnolencia y afectar la capacidad para conducir o manejar maquinaria.
Puede ocurrir aumento de la frecuencia de las convulsiones u otras reacciones adversas si se suspende rápidamente el medicamento. Retirar gradualmente durante un mínimo de 1 semana.
Puede causar edema periférico, cuando se administra concomitantemente con agentes antidiabéticos y tiazolidindiona.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.