Tofacitinib citrato, tableta recubierta, 5 mg, vía oral, código IGSS: 10362

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado en combinación con metotrexato para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido de forma adecuada o que son intolerantes, a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.
Puede administrarse en monoterapia en caso de intolerancia a metotraxate o cuando el tratamiento con metotrexato no sea adecuado.
En combinación con metotrexato para el tratamiento de la artritis psoriásica activa en pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada o que han sido intolerantes a un tratamiento previo con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME).

Reacciones adversas: Infección del tracto respiratorio superior, nasofaringitis, diarrea, dolor de cabeza, hipertensión, anemia, diverticulitis, deshidratación, insomnio, parestesia, disnea, tos, congestión de los senos paranasales, enfermedad pulmonar intersticial, dolor abdominal, dispepsia, vómitos, gastritis, náuseas, esteatosis hepática, erupción, eritema, prurito, dolor musculoesquelético, artralgia, tendinitis, inflamación de las articulaciones, cánceres de piel no melanoma, pirexia, fatiga, edema periférico.

Precauciones de uso: Se han producido infecciones graves que llevaron a la hospitalización o la muerte, incluidas tuberculosis y las infecciones bacterianas, fúngicas invasivas, virales y otras infecciones oportunistas.
Si se desarrolla una infección grave, interrumpa tofacitinib hasta que se controle la infección.

Antes de iniciar el tratamiento, realizar una prueba de tuberculosis latente; si es positivo, iniciar tratamiento para tuberculosis antes de iniciar tofacitinib. Supervise a todos los pacientes para detectar tuberculosis activa durante el tratamiento, incluso si la prueba inicial de tuberculosis latente es negativa.
Se han observado linfomas y otras neoplasias malignas en pacientes tratados con tofacitinib. El trastorno linfoproliferativo posterior al trasplante asociado con el virus de Epstein Barr se ha observado en una tasa mayor en pacientes con trasplante renal tratados con tofacitinib y medicamentos inmunosupresores concomitantes.
En pacientes que pueden tener un mayor riesgo de perforación gastrointestinal (p. ej., pacientes con antecedentes de diverticulitis). Si se presentan síntomas abdominales de nueva aparición deben ser evaluados de inmediato para la identificación temprana de perforación gastrointestinal.
Los parámetros de exámenes de laboratorio pueden sufrir modificaciones, tener especial cuidado en recuento de linfocitos, neutrofilos, hemoglobina, enzimas hepáticas y lípidos.
El tratamiento no es recomendado en pacientes con insuficiencia hepática.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
Tuberculosis activa, infecciones graves y activas como sepsis o infecciones oportunistas.
Insuficiencia hepática grave.
Embarazo y lactancia.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.