Acetazolamida, tableta, 250 mg. Vía oral, código IGSS: 701

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento complementario de: edema sociado a insuficiencia cardíaca congestiva; edema inducido por fármacos; epilepsias centroencefálicas (pequeño mal, convulsiones no localizadas); glaucoma crónico simple (ángulo abierto), glaucoma secundario y preoperatoriamente en glaucoma agudo de ángulo cerrado donde se desea un tipo de retraso de la cirugía para disminuir la presión intraocular.
Prevención o mejora de los síntomas asociados con el mal agudo de montaña en escaladores.

Reacciones adversas: Confusión, convulsiones, somnolencia, parálisis flácida, malestar, parestesias, fotosensibilidad, urticaria, anorexia, diarrea, sabor metálico, náuseas, vómitos, enfermedad hepática, anemia aplásica, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, melena, acidosis, desequilibrio electrolítico, debilidad muscular, hematuria, poliuria, glucosuria, disfunción auditiva o tinnitus, reacciones tipo sulfonamida.

Precauciones de uso: Riesgo de Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, necrosis hepática fulminante, agranulocitosis, anemia aplásica y otras discrasias sanguíneas y anafilaxia.

Pacientes que reciben dosis altas concomitantes de aspirina, ya que se han informado anorexia, taquipnea, letargo, acidosis metabólica, coma y muerte.

Contraindicaciones: Hipopotasemia, Hiponatremia, Acidosis hiperclorémica, Hipersensibilidad a la acetazolamida o sulfa. Enfermedad del hígado. Enfermedad o disfunción renal grave. Uso a largo plazo en glaucoma de ángulo cerrado no congestivo. Cirrosis
Administración a largo plazo en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado crónico no congestivo.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.