Clobazam, tableta, 10 mg, vía oral, código IGSS: 1963

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para el tratamiento adyuvante de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de 2 años de edad o más.

Reacciones adversas: Somnolencia o sedación, Somnolencia, Pirexia, Infección del tracto respiratorio superior, babeo, Agresión, Irritabilidad, Vómitos, Insomnio, Ataxia, Sedación, Estreñimiento, Fatiga, Tos, Hiperactividad psicomotora, Neumonía, Infección del tracto urinario, Disartria, Disminución del apetito, Aumento del apetito, Bronquitis, Disfagia.

Precauciones de uso: El uso concomitante de benzodiazepinas y opioides puede resultar en una profunda sedación, depresión respiratoria, coma y muerte. Reservar prescripción concomitante de estos medicamentos para pacientes para quienes las alternativas de tratamiento alternativo son inadecuadas. Limite las dosis y la duración al mínimo requerido. Seguimiento de los pacientes en busca de signos y síntomas de depresión respiratoria.
y sedación.
El uso de benzodiacepinas, expone a los usuarios a riesgos de abuso, mal uso y adicción, lo que puede llevar a una sobredosis o a la muerte. Abuso y mal uso de las benzodiazepinas comúnmente implica el uso concomitante de otros medicamentos, alcohol y/o sustancias ilícitas, que se asocia con una mayor frecuencia de resultados adversos graves.

Antes de prescribir y durante el tratamiento, evalúe el riesgo de cada paciente de abuso, uso indebido y adicción.

El uso continuado de benzodiazepinas puede dar lugar a dependencia física importante. Los riesgos de la dependencia y la abstinencia aumentan con una mayor duración del tratamiento y una dosis diaria más alta.

La suspensión abrupta o reducción rápida de la dosis de clobazam después del uso continuado puede precipitar reacciones agudas de abstinencia, que pueden poner en peligro la vida. Uutilice una reducción gradual para interrumpir
o reducir la dosis de clobazam.

Labor y parto:

La administración de benzodiazepinas inmediatamente antes o durante el parto puede provocar un síndrome del niño fláccido, que se caracteriza por letargo, hipotermia, hipotonía, depresión respiratoria y dificultad para alimentarse; el síndrome del niño flácido ocurre principalmente dentro de las primeras horas después del nacimiento y puede durar hasta 14 días.

Observar a los recién nacidos expuestos para detectar estos síntomas y manejarlos en consecuencia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.