Imipramina clorhidrato, tableta de 25 mg, Vía oral, código IGSS: 831

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:

Adultos:

Depresión.

Crisis de Ansiedad

Dolor Crónico

Niños y adolescentes:

Enuresis nocturna (en edades superiores a los 5 años donde las terapias alternativas no se consideran apropiadas, y cuando se descarte una causa orgánica).

No hay experiencia disponible para el uso en enuresis nocturna en niños menores de 5 años.

En niños y adolescentes no hay evidencia suficiente de seguridad y eficacia en el tratamiento de la depresión, de las crisis de ansiedad y del dolor crónico. Por lo tanto, el uso en niños y adolescentes (0-17 años) no está recomendado.

Reacciones adversas: Fatiga, letargo, sedación, debilidad, constipación, boca seca, visión borrosa, agitación, ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, vómitos, transpiración, cambios en el ecg, hipotensión ortostática, taquicardia, confusión, síntomas extrapiramidales (sep), mareos, parestesia, tinnitus, erupción aumento de lft, disfunción sexual, convulsión, agranulocitosis, eosinofilia, leucopenia, trombocitopenia, siadh.

Precauciones de uso: En estudios a corto plazo, los antidepresivos aumentaron el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en niños, adolescentes y adultos jóvenes (<24 años) que tomaban antidepresivos para trastornos depresivos mayores y otras enfermedades psiquiátricas.

Este aumento no se observó en pacientes mayores de 24 años; Se observó una ligera disminución del pensamiento suicida en adultos mayores de 65 años.

En niños y adultos jóvenes, se deben sopesar los riesgos frente a los beneficios de tomar antidepresivos.

Se debe vigilar estrechamente a los pacientes para detectar cambios de comportamiento, empeoramiento clínico y tendencias suicidas; Esto debe hacerse durante los primeros 1-2 meses de terapia y ajustes de dosis.

La familia del paciente debe comunicar cualquier cambio abrupto de comportamiento al proveedor de atención médica.

El empeoramiento del comportamiento y las tendencias suicidas que no forman parte de los síntomas presentes pueden requerir la interrupción del tratamiento.

Este medicamento no está aprobado para su uso en pacientes pediátricos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad

Recuperación aguda después de un infarto de miocardio

Coadministración con fármacos serotoninérgicos.

Uso concomitante con o dentro de los 14 días posteriores a IMAO (síndrome serotoninérgico).

El inicio de imipramina en un paciente que está siendo tratado con linezolid o azul de metileno intravenoso está contraindicado debido a un mayor riesgo de síndrome serotoninérgico.

Si es necesario administrar linezolid o azul de metileno por vía intravenosa, suspender la imipramina inmediatamente y vigilar la toxicidad del SNC; puede

reanudar la imipramina 24 horas después de la última dosis de linezolid o azul de metileno o después de 2 semanas de seguimiento, lo que ocurra primero.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.