Mesalazina o Mesalamina, supositorio, 1 g, vía rectal, código IGSS:

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la proctitis ulcerosa de leve a moderadamente activa en adultos.

Reacciones adversas: Mareos, dolor rectal, fiebre, erupción, acné, colitis

Precauciones de uso: Se ha asociado con un síndrome de intolerancia aguda que puede ser difícil de distinguir de una exacerbación de la colitis ulcerosa.
Evaluar los riesgos y beneficios en pacientes con insuficiencia renal conocida o que toman medicamentos nefrotóxicos; monitorear la función renal, suspender si esta empeora.
Posibles reacciones de hipersensibilidad, incluidas miocarditis y pericarditis, suspender si se sospecha.
Suspender ante los primeros signos o síntomas de reacciones adversas cutáneas graves u otros signos de
hipersensibilidad y considere una evaluación adicional.
Aconseje a los pacientes con afecciones cutáneas preexistentes que evite la exposición al sol, use ropa protectora y use un protector solar de amplio espectro cuando esté al aire libre debido al riesgo de fotosensibilidad.
Posible fallo hepático en pacientes con enfermedad hepática preexistente, evalue el riesgo beneficio.
Posible riesgo de aparecimiento de nefrolitiasis.
Aumento del valor de normetanefrina en prueba mediante cromatografíal líquida con deteccion electroquímica, considerar ensayo alternativo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo excipientes, salicilatos o aminosalicilatos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.