Metotrexato sódico, tableta, 2.5 mg, vía oral, código IGSS: 670

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con leucemia linfoblástica aguda como parte de un régimen de mantenimiento de quimioterapia combinada.
Tratamiento de adultos con micosis fungoide (linfoma cutáneo de células T) como agente único o como parte de un régimen de quimioterapia combinada.
Tratamiento de adultos con linfomas no Hodgkin en recaída o refractarios como parte de un régimen combinado de quimioterapia metronómica.
Tratamiento de adultos con artritis reumatoide.
Tratamiento de pacientes pediátricos con artritis idiopática juvenil poliarticular.
Tratamiento de adultos con psoriasis grave.

Reacciones adversas: Aracnoiditis con administración intratecal; toxicidad subaguda con administración intratecal (parálisis de extremidades, parálisis de pares craneales, convulsiones o coma); encefalopatía desmielinizante con irradiación craneal u otra quimioterapia sistémica; enrojecimiento de la piel, hiperuricemia, estomatitis ulcerosa, glositis, gingivitis, náuseas y vómitos, diarrea, anorexia, perforación intestinal, mucositis (dependiente de la dosis), leucopenia, trombocitopenia, insuficiencia renal, azotemia, nefropatía, faringitis.
Alopecia, fotosensibilidad, erupción, malestar abdominal, malestar, fatiga, escalofríos, fiebre, disminución de la resistencia a la infección, hemorragia gastrointestinal, mielosupresión, trastornos de pulmón, neumonía intersticial (aguda, crónica), atrofia del hígado, cirrosis, fibrosis o necrosis hepática, pruebas de función hepática elevadas, insuficiencia hepática.

Precauciones de uso: Para la terapia intratecal y de dosis altas de metotrexato, use la formulación sin conservantes de metotrexato. No utilice la formulación con conservantes de metotrexato para administración intratecal o en dosis altas, porque contiene alcohol bencílico.

El metotrexato debe utilizarse únicamente en neoplasias que amenazan la vida, enfermedades, o en pacientes con psoriasis o artritis reumatoide con enfermedad grave, recalcitrante e invalidante que no responde adecuadamente a otras formas de terapia.

Se han reportado muertes con el uso de metotrexato en el tratamiento de malignas, psoriasis y artritis reumatoide.

Los pacientes deben ser supervisados de cerca para la médula ósea, hígado, pulmón y toxicidades renales.

Los pacientes deben ser informados por su médico de los riesgos implicados y estar bajo el cuidado de un médico durante la terapia.

El uso de regímenes de alta dosis de metotrexato recomendados para osteosarcoma requiere un cuidado meticuloso, no se ha establecido ventaja de dosis altas en otras enfermedades neoplásicas.

Anticoncepción:

Mujeres: Puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas; use un método anticonceptivo eficaz durante y durante los 6 meses posteriores a la dosis final

Hombres: Puede causar daño cromosómico a los espermatozoides. Aconseje a los hombres con parejas femeninas con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos efectivos durante y durante al menos 3 meses después de la dosis final.

Esterilidad:

Mujeres: Puede causar deterioro de la fertilidad y disfunción menstrual durante y después de la interrupción de la terapia; se desconoce si la infertilidad puede revertirse en todas las mujeres afectadas.

Hombres: Puede causar oligospermia o infertilidad durante y después de la interrupción de la terapia; se desconoce si la infertilidad puede revertirse en todos los hombres afectados.

Contraindicaciones: Mujeres embarazadas con enfermedad no maligna. Hipersensibilidad conocida; reacciones severas observadas.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.