Nimodipina, tableta, 30 mg, vía oral, código IGSS: 624

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Indicado para mejorar el resultado neurológico al reducir la incidencia y gravedad de los déficits isquémicos en pacientes con hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurismas de baya intracraneal independientemente de su condición neurológica post-ictus (es decir, Hunt y Hess Grados I-V).

Reacciones adversas: Reducción de la presión arterial sistémica, diarrea, dolor de cabeza, molestias abdominales, erupción, insuficiencia cardiaca, arritmia, anemia, anomalías en el electrocardiograma, hemorragia gastrointestinal, hepatitis. ictericia, trombocitopenia, vómitos, trombosis, vasoespasmo de rebote.

Precauciones de uso: Eventos adversos graves y que amenazan la vida, incluye paro cardíaco, colapso cardiovascular, hipotensión, y bradicardia, han ocurrido cuando el contenido se administra por vía intravenosa.
En pacientes con insuficiencia hepática se disminuye el metabolismo de nimodipino por lo que debe controlarse de cerca la presión arterial y el pulso, demás que deberán recibir una dosis más baja.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. Administración por vía parenteral provoca riesgo de muerte.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.