Penicilamina, tableta o cápsula, 250 mg, vía oral, código IGSS: 1704

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de la enfermedad de Wilson, intoxicación por metales pesados en adultos, adolescentes y niños de 5 años de edad o mayores, cistinuria en adultos, adolescentes y niños de 5 años de edad o mayores, en pacientes con artritis reumatoide activa grave.

Reacciones adversas: Empeoramiento de los síntomas neurológicos (10-50% de los pacientes con enfermedad de Wilson). Suspendido en 20 a 30% de los pacientes con enfermedad de Wilson, Diarrea, Alteración del gusto, Proteinuria, Erupción, Trombocitopenia, Leucopenia Náuseas, vómitos, fiebre, anorexia, pénfigo, reacción liquenoide oral, miastenia gravis, neuropatía, neuritis óptica, acúfenos, síndrome de goodpasture, insuficiencia renal, hepatitis, pancreatitis, anemia hemolítica.

Precauciones de uso: Los antiácidos, la digoxina y el hierro disminuyen los niveles y/o la actividad.
Enfermedad reactiva de las vías respiratorias.
Asociado con bronquiolitis obliterante.
Aumenta el requerimiento del cuerpo de piridoxina.
Potencial para el desarrollo de miastenia gravis (reversible) y otros síntomas neurológicos.
Existe la posibilidad de reacciones graves de hipersensibilidad en pacientes con deficiencia congénita de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Contraindicaciones: Alergia a la penicilina, discontinuar si aparecen reacciones inmunes.

Antecedentes de anemia aplásica relacionada con penicilamina, agranulocitosis.
Insuficiencia renal (evitar si la creatinina está en <50 mL/min).
Concurrencia con sales de oro, antipalúdicos, inmunosupresores, fenilbutazona.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.