Clomipramina, comprimido de liberación prolongada, 75 mg, Vía oral, código IGSS: 861

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso:

Adultos:

Depresión de cualquier etiología, sintomatología y gravedad.

Trastorno obsesivo-compulsivo.

Fobias.

Crisis de angustia

Síndrome de narcolepsia con crisis de cataplejía.

Población pediátrica

Trastorno obsesivo-compulsivo.

No se dispone de experiencia en niños menores de 5 años. En niños y adolescentes, no se dispone de suficiente evidencia de seguridad y eficacia en tratamiento de estados depresivos de varias etiologías y sintomatologías, fobias, crisis de angustia, síndrome de narcolepsia con crisis de cataplejía.

Reacciones adversas: Xerostomía, Dolor de cabeza, Estreñimiento, Fallo de eyaculación, Fatiga, Náuseas, Impotencia, Aumento de peso, Pérdida de peso, Hepatotoxicidad, Mareos, somnolencia, temblor, Dispepsia, Visión borrosa, Retención urinaria, Incapacidad del orgasmo, cambio de la libido, Infarto de miocardio, hipotensión ortostática, Empeoramiento de la depresión, pensamientos suicidas, suicidio, convulsiones, hiperglucemia, Agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, trombocitopenia Temperatura corporal por encima de lo normal, Erupción medicamentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS).

Precauciones de uso: En estudios a corto plazo, los antidepresivos aumentaron el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas en niños, adolescentes y adultos jóvenes (<24 años de edad) que tomaban antidepresivos para trastornos depresivos mayores y otras enfermedades psiquiátricas.

Este aumento no se observó en pacientes mayores de 24 años; Se observó una ligera disminución del pensamiento suicida en adultos mayores de 65 años.

En niños y adultos jóvenes, se deben sopesar los riesgos frente a los beneficios de tomar antidepresivos.

Se debe vigilar estrechamente a los pacientes para detectar cambios de comportamiento, empeoramiento clínico y tendencias suicidas; Esto debe hacerse durante los primeros 1-2 meses de terapia y ajustes de dosis.

La familia del paciente debe comunicar cualquier cambio abrupto de comportamiento al proveedor de atención médica.

El empeoramiento del comportamiento y las tendencias suicidas que no forman parte de los síntomas presentes pueden requerir la interrupción del tratamiento.

Este medicamento no está aprobado para su uso en pacientes pediátricos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad

Trastorno cardiovascular grave

Glaucoma de ángulo estrecho

Cualquier medicamento o condición que prolongue el intervalo QT.

Recuperación aguda después de un infarto de miocardio

Coadministración con fármacos serotoninérgicos.

Concomitante con o dentro de los 14 días posteriores a IMAO (síndrome serotoninérgico)

Iniciar clomipramina en un paciente que está siendo tratado con linezolid o azul de metileno intravenoso está contraindicado debido a un mayor riesgo de síndrome serotoninérgico.

Si es necesario administrar linezolid o azul de metileno por vía intravenosa, suspender la clomipramina inmediatamente y vigilar la toxicidad del SNC; puede reanudar la clomipramina 24 horas después de la última dosis de linezolid o azul de metileno o después de 2 semanas de seguimiento, lo que ocurra primero.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.