# Espiramicina, comprimido 1.5 millones UI, vía oral, código IGSS: 121.

**Dosis:** Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

**Indicaciones de uso:** Faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, infecciones de la cavidad bucal, gonococcias, toxoplasmosis.

**Reacciones adversas:** Trastornos del sistema nervioso como casos ocasionales de parestesia transitoria, disgeusia transitoria, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y colitis pseudomembranosa, rash.

**Precauciones de uso:** Posible prolongación del intervalo QT, precaución cuando se utiliza espiramicina en pacientes con factores de riesgo conocidos de prolongación del intervalo QT como: Desequilibrio electrolítico sin corregir, síndrome congénito de intervalo QT prolongado, enfermedad cardíaca, uso concomitante de medicamentos con efecto conocido de prolongación del intervalo QT (p. ej. antiarrítmicos de la Clase IA y III, antidepresivos tricíclicos, algunos antiinfecciosos, algunos antipsicóticos), pacientes de edad avanzada, neonatos y mujeres pueden ser más sensibles al efecto de prolongación del intervalo QTc.
Se han notificado casos de reacciones adversas cutáneas graves incluyendo síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantematosa aguda generalizada. Se debe advertir a los pacientes de los signos y síntomas y monitorizar cuidadosamente las reacciones cutáneas. Si existen suspender el tratamiento.

**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al principio activo o excipientes.

**Interacciones:** Consulte el Formulario Terapéutico.

**Embarazo y lactancia:** Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

**Referencia:** Adaptado de Formulario Terapéutico.