Hidroclorotiazida clorhidrato, tableta, 50 mg, vía oral, código IGSS: 10565

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Hipertensión arterial: como monofármaco o asociado a otros antihipertensores (betabloqueantes, vasodilatadores, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, reserpina).
Edemas: debidos a insuficiencia cardíaca, renal y hepática leve o moderada; edemas premenstruales e idiopáticos.
Diabetes insípida renal: cuando no esté indicado el tratamiento con hormona antidiurética.
Hipercalciuria idiopática: como tratamiento preventivo de concreciones calcáreas urinarias.

Reacciones adversas: Anafilaxia, anorexia, confusión, trastorno de la estructura hematopoyética, mareo, malestar epigástrico, fatiga, dolor de cabeza, hepatotoxicidad, hipercalcemia, hipercolesterolemia, hiperglucemia, hiperlipidemia, hiperuricemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipotensión, nefritis intersticial, acidosis metabólica, debilidad o calambres musculares, náuseas, angeítis necrotizante, pancreatitis, fototoxicidad, neumonitis, edema pulmonar, púrpura, erupción, dificultad respiratoria, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica toxica, vértigo, vómitos, xantopsia.

Precauciones de uso: Pacientes con enfermedades hepáticas debido a fluctuaciones de las concentraciones séricas de electrolitos que pueden ocasionar una pérdida del equilibrio electrolítico y un coma hepático en los pacientes susceptibles.
Alteración de la tolerancia a la glucosa.

Aumentos de los niveles de calcio, colesterol y triglicéridos.
Utilizar con precaución en enfermedad renal grave (índice de filtrado glomerular < 30 ml/min).
Puede producir o exacerbar la hipopotasemia.
Asociado a una reacción idiosincrática que dé lugar a un derrame coroideo con defecto del campo visual, miopía transitoria aguda o glaucoma agudo de ángulo cerrado. Los síntomas incluyen la aparición aguda de una agudeza visual disminuida o dolor ocular y ocurre normalmente entre unas horas hasta unas semanas después del comienzo del tratamiento. El glaucoma agudo de ángulo cerrado no tratado puede conducir a una pérdida de visión permanente.
Durante el tratamiento con tiazidas, se puede activar el lupus eritematoso.
Las reacciones de hipersensibilidad son más frecuentes en pacientes con alergias y asma.
Precaución cuando un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina se añade a hidroclorotiazida particularmente en pacientes con depleción grave de sodio o depleción de volumen.
Aumento del riesgo de cáncer de piel no-melanoma y carcinoma de células escamosas con la exposición a dosis acumuladas crecientes de hidroclorotiazida.
Edema pulmonar suele aparecer entre unos minutos y unas horas después de la toma de hidroclorotiazida. Al inicio del tratamiento, los síntomas incluyen disnea, fiebre, insuficiencia pulmonar e hipotensión. Si se sospecha diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria aguda se debe retirar el medicamento.
La hidroclorotiazida contenida en este medicamento podría dar un resultado positivo en una prueba antidopaje.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a hidroclorotiazida o sulfonamidas. Anuria.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.