Hidroxiprogesterona caproato, solución inyectable 125 mg/ ml, ampolla 2 ml, vía intramuscular, código IGSS: 310

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: El fármaco está indicado para los siguientes tratamientos de mujeres no embarazadas: adenocarcinoma avanzado del cuerpo uterino (estadio III o IV), amenorrea (primaria y secundaria) y de las hemorragias uterinas anormales debido a desequilibrios hormonales, como fibromas submucosos o cáncer uterino. También el fármaco está indicado para la prueba de la producción endógeno de estrógenos y de la producción de endometrio secretor y descamación.

Reacciones adversas: Episodios trombóticos arteriales y tromboembólicos venosos graves, casos de émbolos pulmonares (algunos mortales), trombosis venosa profunda, infarto miocardio, y derrames en mujeres que utilizan progestinas, lesiones neuro oculares (trombosis de la retina y neuritis óptica), náuseas, vómitos, síntomas gastrointestinales (calambres o distensiones abdominales), edema, hemorragia por disrupción, machado o hemorragia por privación, sensibilidad mamaria, cambios en el peso corporal (aumento o disminución), dolor de cabeza, aumento del moco cervical, erupción alérgica, absceso, dolor en el sitio de inyección, migrañas, cloasma o melasma, ictericia colestásica, aumento de la presión sanguínea, depresión mental, y amenorrea durante o después del tratamiento, anovulación postratamiento, cistitis, hirsutismo, perdido de vello del cuero cabelludo, cambios en la libido, cambios en el apetito, mareos, fatiga, dolores de espalda, prurito o amenorrea, el fármaco puede afectar a las pruebas de laboratorio de: función hepática (aumento de la retención de sulfobromoftalina, otras pruebas); pruebas de coagulación (aumento de protrombina y factores VII, VIII, IX y

X); pruebas de la función tiroidea (aumento de yodo proteico del suero y del yodo unido a proteínas con butanol, disminución de los valores de captación T3).
Después del tratamiento con hidroxiprogesterona de caproato, se han producido algunos casos de tos, disnea, construcción torácica, reacciones de tipo alérgico. La aparición de estos casos puede aumentar con las dosis más altas.

Precauciones de uso: En caso de episodios trombóticos y tromboembólicos, interrumpir el tratamiento, evaluar la pérdida parcial o completa de la visión o verificar si existe una proptosis, diplopía o migraña. Si el examen revela papiledema o lesiones vasculares de la retina, se suspende el fármaco.
En algunos casos hay hipersensibilidad al principio activo. El fármaco está contraindicado en mujeres con antecedentes de hipersensibilidad a una progestina.
En caso de pacientes diabéticos, se monitorea la concentración de glucosa en sangre.
Se debe administrar el paracetamol con precaución, evitando el asma, migraña, epilepsia o disfunción cardiaca o renal, hemorragias irregulares. Se vigilan y diagnostican a los pacientes.
Se recomienda un examen físico de las mamas y los órganos pélvicos y una prueba de Papanicolaou antes del tratamiento.
Se administra la hidroxiprogesterona caproato con precaución en pacientes con antecedentes de depresión psíquica.
El fármaco se suspende si la depresión reaparece en grado grave.

Contraindicaciones: Pacientes con carcinoma de mama conocido o sospechado, cáncer sensible a las hormonas o antecedentes de estas afecciones, hemorragia vaginal anormal no diagnostica, disfunción o enfermedad hepática, aborto retenido, aquellos con antecedentes de hipersensibilidad al medicamento.
Se considera que el fármaco está contraindicado en prueba diagnóstica del embarazo y en pacientes con trastornos trombóticos o tromboembólicos actuales o con antecedentes de estos.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.