Mercaptopurina, tableta, 50 mg, vía oral, código IGSS: 678

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con leucemia linfoblástica aguda como parte de un régimen de mantenimiento de quimioterapia combinada.

Reacciones adversas: LFT elevado, náuseas, vómitos, estomatitis, trombocitopenia, erupción, diarrea, mareos, alopecia, leucopenia

Precauciones de uso: Controlar el conteo sanguíneo completo y ajuste la dosis de mercaptopurina para mielosupresión excesiva. Considere la posibilidad de realizar pruebas en pacientes con mielosupresión grave o episodios repetidos de mielosupresión para la deficiencia de tiopurina S-metiltransferasa o nucleótido difosfatasa. Los pacientes con deficiencia homocigota u homocigota de tiopurina S-metiltransferasa o nucleótido difosfatasa pueden requerir una reducción de la dosis. Vigilar transaminasas, fosfatasa alcalina y bilirrubina por riesgo de hepatotoxicidad. Suspender mercaptopurina al inicio de la hepatotoxicidad.
La respuesta a todas las vacunas puede verse disminuida y existe riesgo de infección con vacunas de virus vivos. Consulte las pautas de vacunación para pacientes inmunocomprometidos.
Se han producido casos agresivos y mortales de linfoma de células T hepatoesplénico. Vigile y trate de inmediato si ocurre síndrome de activación de macrófagos.

Puede causar toxicidad embriofetal. Aconseje a los pacientes con potencial reproductivo sobre el riesgo potencial para el feto y que usen métodos anticonceptivos efectivos.
Esterilidad
Mujeres y hombres: según los hallazgos de estudios en animales, el fármaco puede afectar la fertilidad de hembras y machos.

Contraindicaciones: Ninguna.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.