Capecitabina, tableta, 500 mg, vía oral, código IGSS: 188

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de colon en estadio III como agente único o como componente de un régimen de quimioterapia combinada.
Tratamiento perioperatorio de adultos con cáncer de recto localmente avanzado como componente de quimiorradioterapia.
Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal no resecable o metastásico como agente único o como componente de un régimen de quimioterapia combinada.
Tratamiento de pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico como agente único si la quimioterapia que contiene antraciclinas o taxanos no está indicada.
Tratamiento de pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico en combinación con docetaxel después de la progresión de la enfermedad en quimioterapia previa que contenía antraciclinas.
Tratamiento de adultos con enfermedad metastásica irresecable gástrica, esofágica o cáncer de la unión gastroesofágica como componente de una quimioterapia combinada.
Tratamiento de adultos con cáncer gástrico o adenocarcinoma de la unión gastroesofágico metastásico con sobreexpresión de HER2 que no han recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica como un componente de un régimen de combinación.
Tratamiento adyuvante de adultos con adenocarcinoma de páncreas como componente de un régimen de quimioterapia combinada.

Reacciones adversas: Diarrea, náuseas, anemia, linfopenia, síndrome de manos y pies, edema, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor, parestesia, alopecia, dermatitis, dolor abdominal, anorexia, disminución del apetito, constipación, dispepsia, estomatitis, vómitos, neutropenia, trombocitopenia, disnea, bilirrubina aumentada, irritación de ojo. Dolor en el pecho, dermatitis, prurito, erupción, mareo, dolor de cabeza, debilidad, deshidración, boca seca, dispepsia, alteración del gusto, dolor de espalda.

Precauciones de uso: No se recomienda el uso de capecitabina en pacientes que se sabe que tienen ciertas variantes homocigotas o heterocigotas compuestas de dihidropirimidina deshidrogenasa que resultan en ausencia completa de actividad dihidropirimidina deshidrogenasa.

Retener o suspender permanentemente basado en la evaluación clínica. Ninguna dosis de capecitabina ha demostrado ser segura en pacientes con ausencia completa de actividad dihidropirimidina deshidrogenasa.

Cardiotoxicidad: puede ser más común en pacientes con antecedentes de arteriopatía coronaria. Suspender capecitabina por cardiotoxicidad la seguridad de la reanudación de capecitabina no se ha establecido.

Puede provocar diarrea, suspenda capecitabina y luego reanude con la misma dosis o una dosis reducida, o suspender permanentemente, según la gravedad y la ocurrencia.

Optimice la hidratación antes de comenzar con capecitabina y monitorear el estado de hidratación y la función renal al inicio del estudio y cuando sea clínicamente indicado.

Controle la función renal al inicio y cuando sea clínicamente indicado.

Controle la presencia de lesiones cutáneas graves nuevas o que empeoran. Interrumpa permanentemente capecitabina en pacientes que experimentar una reacción adversa cutánea grave.

Sí aparece síndrome de eritrodisestesia palmar-plantar suspender capecitabina y luego reanudar con la misma dosis o dosis reducida, o suspender permanentemente, en función de severidad y ocurrencia.

Anticoncepción:

Mujeres en edad fértil: Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante los 6 meses posteriores a la última dosis.

Hombres con parejas femeninas con potencial reproductivo: Utilice un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante los 3 meses posteriores a la última dosis.

Esterilidad:

Basado en estudios en animales, puede afectar la fertilidad en hembras y machos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a capecitabina o fluorouracilo (5-FU)
Insuficiencia renal grave (CrCl <30 ml/min).

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.