Claritromicina, tableta, 500 mg, vía oral, código IGSS: 21.

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica:
Tratamiento de infecciones leves a moderadas causadas por aislados susceptibles debido a Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis o Streptococcus pneumoniae
Sinusitis maxilar aguda:
Tratamiento de infecciones leves a moderadas causadas por aislados susceptibles debido a Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis o Streptococcus pneumoniae.
Neumonía adquirida en la comunidad tratamiento de infecciones leves a moderadas causadas por aislados susceptibles debido a:
Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae.
Faringitis/Amigdalitis:
Tratamiento de leve a moderado en infecciones causadas por aislados susceptibles a Streptococcus pyogenes como alternativa en personas que no pueden usar la terapia de primera línea.
Infecciones de la piel y de la estructura de la piel no complicadas:
Tratamiento de leve a moderado de infecciones causadas por aislamientos susceptibles debido a Staphylococcus aureus o Streptococcus piogenes.
Otitis media aguda:
Tratamiento de infecciones leves a moderadas causadas por aislamientos susceptibles debido a Haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis o Streptococcus pneumoniae.

Tratamiento y profilaxis de infecciones micobacterianas diseminadas:
Tratamiento de leve a moderado en infecciones causadas por aislados susceptibles debido a Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare en pacientes con infección por VIH avanzada.
Infección por Helicobacter pylori y enfermedad por úlcera duodenal:
En combinación con otros medicamentos para erradicar H. pylori.

Reacciones adversas: Efectos gastrointestinales generales, gusto anormal, diarrea, náuseas, vómitos, nitrógeno ureico en sangre elevado, dolor abdominal, erupción, dispepsia, acidez estomacal, dolor de cabeza, tiempo de protrombina elevado, anafilaxia, anorexia, ansiedad, colitis por Clostridium difficile, mareo, disnea, pruebas de función hepática elevadas, glositis, alucinaciones, disfunción hepática, hepatitis, hipoglucemia, aumento de la fosfatasa alcalina, aumento de aspartato aminotransferasa, aumento de bilirrubina, aumento de la creatinina sérica, Ictericia, leucopenia, comportamiento maníaco, bloqueo neuromuscular, neutropenia, pancreatitis, psicosis, Prolongación del intervalo QT, convulsiones, Síndrome de Stevens-Johnson, trombocitopenia.

Precauciones de uso: Reacciones de hipersensibilidad aguda grave: como anafilaxia, síndrome de Stevens-johnson, necrólisis epidérmica tóxica, entre otros, suspenda claritromicina si ocurre.
Evite en pacientes con prolongación QT conocida o recibir medicamentos que prolongan el intervalo QT, arritmia ventricular (torsades de pointes), hipopotasemia/hipomagnesemia, significativa bradicardia, o que estén tomando antiarrítmicos Clase IA o III.
Disfunción hepática, incluido aumento de las enzimas hepáticas y alteraciones hepatocelulares y/o colestásicas. Se ha informado hepatitis, con o sin ictericia, con claritromicina, suspender si se presentan signos y síntomas de hepatitis.

Se pueden producir reacciones adversas graves debido a las interacciones farmacológicas con colchicina, algunos hipolipemiantes, algún bloqueador del canal de calcio y otras drogas.
Riesgo de mortalidad por todas las causas un año o más después del final del tratamiento en pacientes con enfermedad arterial coronaria.

Equilibre este riesgo potencial con el beneficio del tratamiento al prescribir claritromicina en estos pacientes.
Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile con el uso de casi todos los antibacterianos, hasta dos meses después de la administración y puede variar en severidad desde diarrea leve hasta colitis fatal. De ocurrir, suspender el tratamiento.
Toxicidad embriofetal: Según hallazgos en animales, claritromicina no es recomendado para uso en mujeres embarazadas excepto en circunstancias clínicas donde no es apropiada una terapia alternativa.
Se ha notificado exacerbación de la miastenia grave en pacientes que reciben claritromicina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad documentada a claritromicina o cualquier macrólido.
Coadministración con pimozida, cisaprida, ergotamina y dihidroergotamina por posibles arritmias cardiacas.
Antecedentes de ictericia colestática o disfunción hepática asociada con el uso previo de claritromicina.
Coadministración con colchicina en pacientes con insuficiencia renal o hepática.
Administración conjunta con inhibidores de la HMG-CoA reductasa (estatinas) que se metabolizan ampliamente por CYP3A4 (lovastatina, simvastatina), debido al mayor riesgo de miopatía, incluida la rabdomiólisis.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.