Progesterona Micronizada, cápsula de gelatina suave 100 mg, vía intramuscular, código IGSS: 10359

Dosis: Según lo prescrito por su médico tratante en la receta.

Indicaciones de uso: Tratamiento de trastornos asociados a una insuficiencia en progesterona: irregularidades del ciclo menstrual por disovulación o anovulación, síndrome premenstrual, premenopausia.
En caso de pacientes con menopausia se utiliza como un complemento del tratamiento estrogénico en mujeres con útero intacto.

Reacciones adversas: Dolor de cabeza, sensibilidad mamaria, mareos, dolor abdominal, depresión, dolor mamario, enfermedad viral, fatiga, náuseas, cambios de humor, demencia, probable en mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años, anorexia, debilidad, cambio de peso (menos frecuente), vómitos, edema, tromboflebitis, ictericia colestásica. Los siguientes efectos adversos aparecen en mujeres posmenopáusicas de 50-79 años: Trombosis venosa profunda, infarto miocardio, derrame cerebrovascular, embolia pulmonar, cáncer de mama invasivo. Con menos frecuencia se produce: amenorrea; hemorragia intermenstrual; cambio en el flujo menstrual; manchas; cambio en las mamas.

Precauciones de uso: En caso de somnolencia es recomendable tomar las cápsulas antes de dormir por la noche.
El tratamiento no se considera contraceptivo según la dosis y condiciones preconizadas de empleo.
En caso de que la secreción del lúteo es insuficiente no se utiliza la progesterona micronizada para la amenaza de aborto o prevención de abortos repetitivos.

Gran parte de abortos espontáneos precoces son debido a trastornos genéticos, otros abortos son causados por procesos infecciosos o mecánicos. Estos casos el fármaco solo afecta el retraso de la expulsión del embrión muerto o el retraso de la interrupción de un embarazo no evolutivo.
No se utiliza el fármaco en el 1er trimestre de embarazo y solo por vía vaginal.
Existen los riesgos de los efectos adversos sobre el hígado durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes del medicamento.
Pacientes con hemorragia vaginal anormal no diagnosticado.
Alteraciones de la función hepática.
Antecedentes de desórdenes tromboembólicos y tromboflebitis aguda.
Cáncer de mama/genital; aborto retenido o embarazo ectópico; apoplejía cerebral.

Interacciones: Consulte el Formulario Terapéutico.

Embarazo y lactancia: Antes de tomar este medicamento, informar al médico tratante si está embarazada o si sospecha estarlo, y si es compatible con la lactancia.

Referencia: Adaptado de Formulario Terapéutico.